

Aus der Hautklinik der Universität Berlin
Direktor: Professor Dr. med. Frieboes

Die Gonococcensepsis im klinischen Bilde

Inaugural-Differtation

zur

Erlangung der
Medizinischen Doktorwürde

an der

Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Berlin

vorgelegt von

Hubert Galm
aus Afchaffenburg a. Main

Tag der Promotion: -4. Mai 1934

1934

Druckerei und Verlagsanstalt Dr. J. Kirsch AG., Afchaffenburg

Gedruckt mit Genehmigung
der
Medizinischen Fakultät der Universität Berlin

Dekan: Professor Dr. Gocht

Referent: Professor Dr. Gottron

Korreferent: Professor Dr. Frieboes



Einleitung

Die Gonokokkensepsis, insbesondere die mit tödlichem Ausgang ist äußerst selten. H i s hat darauf bereits 1892 hingewiesen, anlässlich der Mitteilung einer eigenen Beobachtung, der er aus den Krankengeschichten des Leipziger Krankenhauses bei Durchsicht der Journale aus mehreren Jahrzehnten nur noch einen weiteren Fall anreihen konnte. In einer neueren zusammenfassenden Arbeit von F a u r e und M. B e a u l i e u aus dem Jahre 1926 sind insgesamt nur 34 Fälle zusammengestellt. Auch an der Berliner Universitätsklinik wurde in den letzten zwölf Jahren die Gonokokkensepsis trotz der Größe des zur Verfügung stehenden Materials recht selten gesehen. Die hier beobachteten Fälle sollen im Folgenden geschildert werden.

Fall I.

Der erste Fall im Jahre 1920 war ein Student M. S., der am 2. 4. 20 in die stationäre Behandlung der Klinik kam.

Der Kranke war vor der am 18. 5. erfolgten Infektion nicht geschlechtskrank. Am 21. 5. trat eitriger Ausfluß aus der Harnröhre, in dem Gonokokken nachgewiesen wurden.

10 Tage nach der Infektion, also am 28. 5., und vier Tage nach Beginn der Behandlung, die in Spülungen und Injektionen bestand, begann das rechte Knie zu schmerzen, ohne daß zunächst eine Schwellung sichtbar wurde. (Arthralgia).

Fast gleichzeitig traten in beiden Handgelenken dieselben Erscheinungen auf.

Therapie: Lichtbogen.

Darauf Rückbildung der Beschwerden im rechten Handgelenk. Im linken Handgelenk steigerten sich die Beschwerden unter gleichzeitiger Herausbildung einer äußerst schmerzhaften Schwellung. Bewegungsbefchränkung war die Folge.

Am 1. 6. klagte der Kranke über Schmerzen in der Wadenmuskulatur. Es bestand hier Spannungsgefühl.

Der Aufnahmebefund zu Beginn der stationären Behandlung am 2. 6. war folgender:

Die Familienanamnese ergibt keine Besonderheiten außer der Tatsache, daß die Mutter des Kranken häufig rheumatische Erkrankungen hatte.

Der Kranke selbst ist blond, auffallend blaß, entsprechend seinem Alter, seiner Sportbetätigung ein kräftiger, muskulöser Mensch.

Die inneren Organe weisen keinen krankhaften Befund auf.

An der Lunge: Schall regelrecht, Atemgeräusch über der ganzen Lunge vesikulär.

Am Herzen: Grenzen normal, Töne rein, Aktion regelmäßig. Subjektiv werden ebenfalls keine Beschwerden geäußert. Abdomen — Magen — Darm sind o. B., ebenso das Nervensystem.

Extremitäten: Am unteren Drittel des linken Unterarms in der Handgelenksgegend und auf der Dorsalfläche der Hand (hier am stärksten) fällt eine teigige Schwellung auf. Die Haut in deren Bereich ist blaurötlich und es besteht starke Druckschmerzhaftigkeit.

Umfang des Handgelenks: rechts 17 cm, links 19 cm.

Umfang der Hand: rechts 20 cm, links 22 cm.

Das rechte Kniegelenk weist infolge einer deutlich sichtbaren Schwellung eine unförmige Gestalt auf. Die Konturen sind verstrichen. Es läßt sich Tanzen der Patella nachweisen.

Knieumfang: rechts 39 cm, links 37 cm.

Die Wadenmuskulatur rechts ist im Ganzen oedematös geschwollen und ist stark druckempfindlich. Die Stelle höchster Druckschmerzhaftigkeit entspricht einer umschriebenen pflaumengroßen Schwellung im rechten Muskel Gastrocnemius.

Umfang der beiden Unterschenkel am Punkte ihrer größten Dicke beträgt rechts 35,5 cm, links 34 cm. (Der Kranke spielte links Fußball und war Linkshänder.)

Es besteht eine geringgradige Bewegungsbeschränkung des Kniegelenks, dagegen eine hochgradige sowohl aktive wie passive am linken Handgelenk. An den Fingern, besonders an den Digni 2—4, ist die Beugung in höherem Maße als die Streckung beschränkt.

Die zusammenfassende Diagnose an diesem Zeitpunkt des Krankheitsbildes lautet:

Urethritis gonorrhoeica

Arthritis des rechten Kniegelenkes

Arthritis des linken Handgelenks
Tendovaginitis der Fingerstrecker links
Myositis der Wadenmuskulatur rechts.

Therapie: Sie besteht in Spülung der Harnröhre mit Albargin, Stauung am linken Arm, warmen Packungen der Hand und des Knies, Lichtkassen, intern wird Atophan gegeben. In den ersten Tagen wurde eine weitgehendste Ruhigstellung der linken Hand, aktive und passive Bewegung des rechten Knies angeordnet.

Die weitere Verlaufsweise der Krankheit ist folgende:

Am 7. 6. Der Gelenkerguß im rechten Knie ist erheblich zurückgegangen, die Schmerzhaftigkeit hat nachgelassen. Der linke Handrücken zeigt ebenfalls eine Abnahme der diffusen Schwellung und Rötung, während die Druckempfindlichkeit im Handgelenk eine stärkere geworden ist. Die Wadenmuskulatur ist weniger geschwollen und druckschmerzhaft. Temperatur 37—38. Therap. Veronal 0,5.

Am 8. 6. Am Knie- und Handgelenk subjektive und objektive Besserung. Neuauftreten ist eine starke Druckempfindlichkeit am rechten Malleolus externus und zwar an dessen unterem Rand im Verlauf der Sehnen Scheide des Muskulus peroneus longus et brevis (Tendovaginitis). Therap.: Stauungsbinde an Arm und Bein. Temperatur: 37—38°.

Am 12. 6. Allgemeinbefinden ist gut, Herz und Lunge ohne Krankheitserrscheinungen. Die Kniegelenkschwellung wie die Schwellung im Bereich des Handrückens ist weitgehend zurückgegangen, während die Handgelenksgegend noch erhebliche entzündliche Erscheinungen (Schwellung, Druckempfindlichkeit und Bewegungsbeschränkung) aufweist.

An der rechten Wade sind Zeichen einer Myositis nicht mehr vorhanden. Die Schwellung, Rötung und Druckempfindlichkeit nimmt in der Gegend des äußeren linken Malleolus noch immer zu.

Am 15. 6. Das Kniegelenk ist wieder frei beweglich und die vergleichende Messung des Umfangs ergibt keine Differenz zwischen beiden. Im linken Handgelenk ebenfalls weitgehende Besserung. Beschwerden in der Gegend des rechten äußeren Malleolus halten an.

Herz und Lunge sind ohne krankhaften Befund.

Urin ist frei von Eiweiß.

Am 21. 6. Eine Schwellung der linken Hand und ihres Gelenks ist nicht mehr vorhanden, was durch die vergleichende Messung bestätigt wird, wohl aber besteht noch eine ausgesprochene Schmerzhaftigkeit auf Druck und bei Bewegung. Schmerzempfindung ist vor allem bei der Beugung, in geringerem Umfange bei der Streckung vorhanden. Befriedigend ist auch die Seitwärtsbewegung im Handgelenk. Die Finger sind vornehmlich in ihrer Streckung behindert, während die Beugung fast ohne Beschränkung möglich ist. Die Krankheitszeichen haben sich am rechten äußeren Malleolus ausgeprägter entwickelt und sind auf das Dorsum pedis übergegangen, das geschwollen, gerötet und druckschmerzhaft ist. Ferner hat sich eine umschriebene Druckempfindlichkeit auf der Flexorseite in der Gegend des 5. Metatarsale ausgebildet.

Am 24. 6. Die Beschwerden in der Gegend des linken Fußgelenks zeigen weitgehenden Rückgang. In der rechten Wadenmuskulatur, an der Grenze zwischen oberem und mittlerem Drittel des M. Gastrocnemius besteht eine unscharf begrenzte druckschmerzhafte Infiltration, ebenso in der Mitte der Beugeite des linken Unterschenkels.

Am 26. 6. Am Vortage, abends hohe Temperatursteigerung (40°), während der Nacht traten plötzlich stechende Schmerzen und Beklemmungsgefühl beim tiefen Atmen auf. Die Schmerzen werden nach hinten rechts unter das Schulterblatt, links unter die Mamilla lokalisiert. Die Lungenuntersuchung ergibt keine ausgesprochene Dämpfung, kein Bronchialatmen, dagegen vereinzelte Reibegeräusche, die nur vorübergehend und wenig ausgesprochen hörbar sind. (Umschriebene Pleuritis.)

Am 28. 6. An den Lungen sind keine R.-G. mehr vorhanden.

Die Rötung am rechten Malleolus ist verschwunden, eine geringe Druckschmerzhaftigkeit ist noch vorhanden.

Neuaufgetreten ist eine umschriebene Rötung in der Gegend des linken dritten Costo-sternalgelenkes, das spontan und auf Druck schmerzhaft ist. Temp. $37,5-38,9^{\circ}$.

Am 29. 6. Die wiederholte Herzuntersuchung sowie auch jetzt wieder die Lungenuntersuchung konnte keinen krankhaften Befund aufdecken. Ausfluß aus der Harnröhre ist seit 14 Tagen nicht mehr vorhanden, der Urin feither fast immer vollkommen klar.

(Aussetzen mit der Albarginbehandlung, statt dessen Spülung mit Zink. sulfuric.)

Das oben erwähnte dritte linke Costo-sternalgelenk ist noch äußerst druckempfindlich.

Am 1. 7. An der Prostata, den Samenblasen und den Nebenhoden konnten während des bisherigen Krankheitsverlaufes durch Betastung keine krankhaften Befunde erhoben werden.

Das dritte Costo-sternalgelenk und die Malleolusgegend ist jetzt frei von Krankheitserrscheinungen.

Am 3. 7. Subjektiv äußert der Patient keine Beschwerden mehr.

Bei der Herzuntersuchung findet sich eine Unreinheit des ersten Tones, keine Herzvergrößerung, Puls ist regelmäßig und voll.

Am 7. 7. Eine Vergrößerung der Herzdämpfung konnte in wiederholter Untersuchung ausgeschlossen werden. Immer deutlicher bildete sich indessen ein systolisches Geräusch heraus, das sowohl an der Spitze wie an der Basis hörbar ist. Das Geräusch ist leise, etwas kratzend.

Die innere Klinik behält sich Entscheidung vor, ob Endocarditis oder nur ein accidentelles Geräusch vorliegt, das durch das Fieber ausgelöst ist (Temp. 38,7—39,4 °). Seit heute klagt der Kranke über Kopfschmerzen. An der hinteren Rachenwand werden reichliche Mengen von schleimigem Sekret beobachtet. Die Untersuchung und das Röntgenbild in der Hals-, Nasen-Klinik der Charité ergab jedoch keinen Anhalt für eine Erkrankung der Nebenhöhlen.

Am 12. 7. Die Erscheinungen von seiten des Herzens sind jetzt ausgeprägter. Deutliches systolisches und zartes diastolisches Geräusch über allen Ostien, am stärksten über der Basis zu hören. Eine Herzvergrößerung ist nicht nachweisbar. Puls ist voll, frequent. (100 in der Minute, Temp. an diesem Tage am Morgen 38, mittags 40,6, gegen Abend 38,8), also relative Verlangsamung, Bradyedie.) Das Urinsediment enthält keine pathologischen Formelemente.

Am 14. 7. Das Allgemeinbefinden des Patienten sowie sein Appetit sind gut, nur noch geringe Kopfschmerzen. In den Morgenstunden jedoch zuweilen Schüttelfröste (40,1). Der Herzbefund ist insofern verändert, als das Geräusch an der Spitze jetzt weniger deutlicher ist wie in den letzten Tagen, an der Basis aber in alter Stärke fortbesteht.

Es bestehen keine Krankheitszeichen mehr an den Gelenken.

Am 16. 7. Wiederum morgendliche Schüttelfröste (40,5), Puls 110 um 10 Uhr. In der übrigen Zeit fühlt der Kranke sich weiterhin wohl. Das Herz weist geringe Verbreiterung nach rechts hin auf. Das Herzgeräusch ist immer mehr über dem Pulmonalostium lokalisiert und ist fast rein diastolisch (Pulmonalinsuffizienz).

Die Urinuntersuchung auf Eiweiß war negativ, ebenso die Sedi-
mentuntersuchung.

Während des Fieberanfalles wurde Blut entnommen zur An-
legung von Blutkulturen, die steril blieben.

Am 17. 7. Erneute Anlegung von Blutkulturen, die ebenfalls
steril blieben.

Die Herzverbreiterung nach rechts wird größer.

Das Herzgeräusch beschränkt sich nunmehr auf das Pulmona-
lostium und ist als lautes, weiches Geräusch in der diastolischen
Phase zu hören.

Am 19. 7. Der Herzbefund ist der gleiche. Im Bereich der Ellen-
beugen und der Gefäßgegend wird eine Purpura festgestellt, in
Form von unregelmäßig ausgestreuten, meist stecknadelkopfgroßen,
zuweilen linsengroßen Blutflecken, die bald mehr hellrot, bald mehr
düsterrot sind.

Am 20. 7. Die Diagnose Pulmonalinsuffizienz wird immer ge-
sicherter.

Die Lungen weisen keinen pathologischen Befund auf, auch läßt
sich kein Erguß in den Pleurahöhlen nachweisen.

Die Milz ist eben tastbar, auch die Leber ist vergrößert und
überragt um zwei Querfinger den Rippenbogen. Der Leib im
Ganzen ist meteoristisch aufgetrieben.

Am 21. 7. neue vermehrte Ausaat von Purpura in der Gefäß-
gegend.

Am 21. 7. Der Herzbefund ist der gleiche. Es hat sich ein leicht
bellender Husten eingestellt, das Atemgeräusch über der ganzen
Lunge ist jedoch vesikulär, keine Dämpfung.

Am 23. 7. Die fortlaufend durchgeführte Urinuntersuchung er-
gibt heute das Vorhandensein großer Eiweißmengen. Im Sediment
werden Leukocyten und geschwänzte Epithelien nachgewiesen.
Harnmenge pro Tag 1200, spez. G. 1012. Reaktion sauer. Therap.
Salol.

Am 24. 7. Gesamtbefund unverändert.

Am 25. 7. Mehrmals am Tage Auftreten von Brechreiz. Herz-

befund der gleiche. Lungen frei von krankhaften Erscheinungen. Mäßig ausgeprägter Meteorismus, kein Ascites. Die Purpura ist fast vollkommen verschwunden, an den Gefäßbacken nur noch 4—5 linfengroße, blaurote, ziemlich scharf begrenzte Flecke.

Am 27. 7. Am Herzen keine zunehmende Verbreiterung. Geräusche sind wieder sowohl an der Spitze wie auch an der Aorta besser hörbar, außerdem tritt auch das systolische Geräusch wieder deutlicher hervor. Das diastolische überwiegt besonders an der Pulmonalis noch stark. Die wiederholt geprüften Reflexe waren stets gesteigert.

In der Gefäßgegend im Bereich der früher bestandenen Purpura-herde ist eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit auf Nadelstiche feststellbar.

Die Blutuntersuchung ergab:

Hämoglobingehalt	40 % (Sahli)
Erythrocyten	2 300 000
Leukocyten	32 800
Neutrophile	75 %
Eosinophile	2,0 %
Monocyten	2,0 %
Lymphocyten	20,0 % (gr. u. kl.)

Am 30. 7. Keine Aenderung des Befundes. Puls kräftig, Frequenz desselben 80—100. Temperatur zwischen 38—40.

Am 1. 8. Erneutes Auftreten von Brechreiz, der in Verbindung mit der relativen Bradycardie an eine menigeale Reizung denken läßt.

Die Hautblässe im Bereich der gesamten Hautdecke hat zugenommen.

Am 4. 8. Das Befinden des Patienten hat sich subjektiv gebessert. Am Cor unveränderter Befund, nur sind die Geräusche an der Spitze etwas weniger deutlich. Das Bild wird von dem starken diastolischen Geräusch über der Pulmonalis beherrscht. Es besteht eine treppenförmige Verbreiterung des Herzens nach der rechten Seite hin (5 cm über die Mittellinie). Eine Verbreiterung nach links ist nicht feststellbar. Die Untersuchung der Prostata, der Samenblasen und der Nebenhoden, die des öfteren schon erfolgt war, gab auch jetzt bei Betaftung keinen Anhaltspunkt für krankhafte Veränderungen.

Therap.: Statt des Salol wird Urotropin gegeben.

Am 6. 8. Keine Besserung des Allgemeinbefindens.

Therap.: Jod-Collargol 7 ccm.

Am 7. 8. Auszählung der weißen Blutkörperchen ergibt 23 700.

Am 8. 8. Die Geräusche über der Pulmonalis sind lauter geworden.

Am 9. 8. Am Nachmittag erneuter Brechreiz, der tagelang nicht bestanden hatte. Das Allgemeinbefinden ist in der fieberlosen Zeit gut.

Die Purpura ist spurlos verschwunden, Rezidive sind nicht aufgetreten.

Am 12. 8. Die Geräusche am Herzen sind kaum hörbar, subjektiv ist eine Besserung festzustellen.

Haemoglobin 30 %, Leuko: 18 500.

Im Sediment keine Gonokokken, keine Epithelien, keine Zylinder, wenig Leukocyten.

Am 13. 8. Weitere Besserung des Befindens, der Patient konnte zum ersten Mal länger schlafen.

Am 18. 8. Seit der vorletzten Collargolverabreichung keine Schüttelfröste mehr, das Fieber ist kontinuierlicher geworden.

Das Herzgeräusch ist wieder deutlicher. Anscheinend steht der Intensitätswechsel in einer direkten Wechselbeziehung zur Temperaturhöhe.

Es besteht Meteorismus..

Psychisch leichte Depression und Apathie.

Urin ist frei von pathologischen Bestandteilen.

Am 20. 8. Das Befinden des Patienten hat sich weiter gebessert, seine Temperatur ist fast normal. Am Herzen ist immer noch das diastolische Geräusch über der Pulmonalis zu hören. Geringe Anstrengungen lösen Hustenstöße aus. Die Untersuchung der Lungen ergab auch jetzt kein sicheres pathologisches Atemgeräusch und keine Dämpfung. Seit 2 Tagen werden Oedeme an den Knöcheln beobachtet, die als marastische Oedeme aufgefaßt werden. Der Urin ist wiederholt auf Eiweiß und Formelemente untersucht, mit Ausnahme des einmaligen genannten Eiweißbefundes ohne pathologische Bestandteile.

Therap.: Viermal täglich Natr. coffein. per os. Argoflavin 0,05/10.

Am 21. 8. Der Anaemie halber wird Arsen in Form von Neofalvarfan gegeben (0,05).

Am 22. 8. Das Allgemeinbefinden ist günstig, Husten und Brechreiz bestehen weiter. Rechts hinten unten über der Lunge wird eine handbreite Dämpfung festgestellt. Therap.: Jodpinselung.

Am 23. 8. Die Dämpfung umfaßt etwa nur noch drei Querfingerbreite. Das Atemgeräusch in diesem Bereich ist abgeschwächt, aber vesikulär, der Stimmfremitus nicht erhöht. Die Oedeme an abgängigen Körperpartien haben nicht zugenommen.

Am 25. 8. Brechreiz ist weiterhin vorhanden. Deshalb vor dem Essen Verabfolgung von einigen Tropfen Kokain. Das Atemgeräusch über der Lunge ist nicht mehr abgeschwächt. Im Blute: 83 % Neutrophile; 2 % gr. Monocyten; 9 % kl. Lymphocyten; 6 % Lymphobl. Eosinophile fehlen.

Die Oedeme an den Beinen sind verschwunden. Im Urin: Urobilinogen +, Urobilin: —.

Bilirubin: +, Sach.: —, Alb: +.

Am 26. 8. Blut: Erythr. 480 000; Hgb.: 20 %; Leuko: 61 000; Neutro: 83 %; Stab: segmentk. = 1:18; Lymphobl. 3 % Lymphoc. 9 %; Mononucleäre 5 %.

Am 30. 8. Seit drei Tagen besteht ein starker Schwächezustand und großes Schlafbedürfnis, der Kranke phantasiert.

Das Herz zeigt noch die gleichen Größenverhältnisse und dieselbe Form wie früher. Ueber der Pulmonalis ist das systolische Geräusch zur Zeit etwas stärker als das diastolische. Der Puls, der voll und kräftig war und in seiner Frequenz der Temperatur entsprach oder unter derselben blieb, ist jetzt etwas beschleunigt. Es wird Digipurat gegeben.

Am 1. 9. Im Blute 29 500 Leukocyten, 424 000 Erythrocyten, Haemoglobin 19 %.

Am 2. 9. Im Urinfediment keine Zylinder, vereinzelt Schleim, Leukocyten und Epithelien. Urinmenge nur 200 ccm. 5 % Albumen. Das Allgemeinbefinden des Patienten ist wesentlich verschlechtert. Infolge des ständigen Brechreizes ist Nahrungsaufnahme per os nicht mehr möglich. Der Kranke wird nur durch Klismen ernährt (100 ccm 2 mal). Außerdem werden Tropfeinläufe angewandt (1000 ccm Ringerlösung).

Am 3. 9. Neuerdings wird im rechten Unterlappen der Lunge leicht gedämpfter Klopfeschall und bei den ersten Atemzügen werden wenige feuchte R. G. s. festgestellt.

Am Nachmittag: Anfall von Atemnot mit Herzbeklemmung.

Der Puls ist weich und beschleunigt. Nach der Injektion von 4 ccm Kampfer weicht der bedrohliche Zustand. An den Lungen keine weiteren Veränderungen. Der Klopfschall ist rechts hinten unten etwas verkürzt, der Stimmfremitus verstärkt, sonst abgesehen von einigen R. G. s., die nach den ersten Atemzügen verschwinden, kein krankhafter Auskultationsbefund. Die Tropfeinläufe mit Ringerlösung verdünnt werden weiter gegeben, außerdem 900 ccm Traubenzuckerlösung intravenös, als Herzstärkungsmittel Digi-purat 0,2.

Am 4. 9. Es besteht ein starker Schwächezustand. Die Nährlösungen und Tropfeinläufe werden nicht mehr resorbiert. Es werden nochmals 900 ccm 5% Traubenzuckerlösung intravenös gespritzt. An der Herzspitze hört man jetzt dem Ohr nahklingend ein schabendes pericarditisches Geräusch neben den systolischen und diastolischen Geräuschen. Die Diurese ist ungenügend.

Am 5. 9. Der Kräfteverfall ist weiter fortgeschritten. Mehrere Kampferinjektionen vermögen nicht die drohende Herzschwäche zu beheben. Unter zunehmender Herzinsuffizienz tritt gegen 11 Uhr der Tod ein.

Zusammenfassung.

Das Besondere des Krankheitsfalles ist schon gegeben in der Seltenheit der tödlich verlaufenen Gonokokkensepsis. Darüber hinaus ist in vorliegendem Falle die schon relativ kurz nach der Infektion zu Tage tretende Generalisierung bemerkenswert. Diese erfolgte durch Befallenwerden des Kniegelenks 10 Tage nach der Infektion, 4 Tage nach Auftreten des Ausflusses. Beachtung verdient vor allem auch die während des Krankheitsverlaufes beobachtete Reichhaltigkeit der Symptome, wobei insbesondere wieder hinzuweisen ist auf einige nur selten bei Gonokokkensepsis feststellbare Krankheitszeichen.

Im Vordergrund stand (auch in unserem Falle), wie das meist bei der Gonokokkensepsis der Fall ist, das Befallenwerden des Bewegungsapparates und des Endocards.

Vom Bewegungsapparat waren vorzüglich die Gelenke und in zweiter Linie die Muskeln betroffen, während am Knochen nur geringe Veränderungen in Form von Periostitis feststellbar waren.

Bezüglich der Gelenke ist hervorzuheben, daß zunächst kurze Zeit eine Monarthrit und zwar im Kniegelenk bestand, daß aber bald eine Polyarthrit (Knie, Hand — Finger links, später Sterno-

costal-Gelenk) vorhanden war, bei der aber die betroffenen Gelenke nicht gleichzeitig daselbe Entwicklungsstadium des Entzündungsprozesses aufwiesen. Auch in diesem Fall waren, wie das ja für die Gonorrhoe charakteristisch ist, vornehmlich die großen Gelenke, die im Leben am meisten beansprucht wurden, ergriffen. Hinzuweisen ist aber auch darauf, daß bei unserem Kranken Gelenke, wie z. B. das 3. r. Sternokostal-Gelenk betroffen waren, deren Erkrankung an sich bei der Gonorrhoe bisher nur selten beobachtet wurde.

Beachtenswert für das Zustandekommen des polyarthritischen Krankheitsbildes im ersten Drittel des Krankheitsverlaufes dürfte es sein, daß bei unserem Kranken doch anscheinend eine sogenannte familiäre arthritische Diathese vorgelegen hat. Erfahren wir doch aus der Familiengeschichte den bemerkenswerten Hinweis, daß die Mutter des Kranken während ihres Lebens häufig an arthritischen Beschwerden gelitten hat.

Nächst den Gelenken waren vom Bewegungsapparat in verhältnismäßig für Gonorrhoe ungewöhnlichem Umfange die Muskeln und Sehnen scheiden miterkrankt.

Die Muskelerkrankung trat zum Teil unter dem Bilde umschriebener Muskelabzesse, zum Teil unter dem diffusen interstitieller Entzündung zu Tage. Des Weiteren ist hier wieder darauf hinzuweisen, daß bei dem Kranken Muskeln befallen wurden, die von ihm während des Lebens stark beansprucht worden waren. Als eifriger Fußballspieler wies er im Verhältnis zu seiner sonstigen Körperentwicklung eine etwas hypertrophische Wadenmuskulatur auf. Diese stark beanspruchte Muskulatur war es, die bald nach Auftreten der ersten Gelenkerkrankungen mitergriffen wurde.

Sitz der Erkrankung waren alsdann im Bereich des rechten Unterschenkels die Sehnen der beiden Peronei. Daneben waren bei unserm Kranken die auch sonst bei Ge-Sepsis häufiger erkrankten Sehnen der Handstrecker befallen.

Eine Periostitis fand sich nur in geringem Umfange im Bereich des Malleolus externus.

Für den Krankheitsverlauf entscheidend war das Mitergriffensein des Endocards. Hierbei ist von Interesse die allmähliche Entwicklung der Veränderungen am Endocard, bei denen man sich im Beginn darüber im Unklaren war, ob die hörbaren Geräusche accidenteller Natur oder ob sie Ausdruck eines Klappenfehlers

waren. Auch die Feststellung des vorliegenden Klappenfehlers machte anfangs große Schwierigkeiten. In diesem Falle besonders beachtenswert ist dabei die sich schließlich herausbildende Pulmonalinsuffizienz. Diese ist als erworbener Klappenfehler an sich schon selten, besonders selten aber ist sie als Folge einer gonorrhöischen Endocarditis. Das Erscheinungsbild der Pulmonalinsuffizienz war bezüglich der zu Tage tretenden Herzconfiguration und der dabei wahrnehmbaren Herzgeräusche voll ausgeprägt. Dabei ist vornehmlich hinzuweisen auf die deutlich treppenartige Begrenzungslinie der rechten Herzhälfte.

Nach Ausbildung der Endocarditis kam es wohl infolge dieser und zwar in der 4.—5. Krankheitswoche, zur Entwicklung einer symmetrisch ausgebreiteten Purpura. Von dieser kann man sagen, daß sie in der Hauptsache in einem Schub auftrat, auf den bald darauf ein kleiner Nachschub folgte. Sie verschwand alsdann spurlos, ohne sich zu wiederholen.

Nicht häufig ist im Verlaufe einer Gonokokkensepsis ein umschriebenes Befallensein seröser Häute. Bei unserem Kranken war eine umschriebene Pleuritis von kurzer Bestandsdauer wahrnehmbar.

Ob und inwieweit die kurz vor dem Exitus vorhandene Pneumonie pathogenetisch durch die Gonokokkenwirksamkeit bedingt war, muß offen bleiben. Jedenfalls ist ein derartiges Geſchehen gelegentlich beobachtet worden.

Hinzuweisen ist noch auf das Mitergriffensein der Meningen. Klinisch äußerte sich der Meningismus durch die Benommenheit, die Kopfschmerzen, durch das Verhalten der Reflexe, die gesteigert waren durch das Auftreten des Brechreizes und durch die relative Bradycardie.

Auch die Milz und in geringerem Umfang die Leber erwiesen sich als Ausdruck der septischen Erkrankung vergrößert. Im Sinne der Sepsis sprach auch die Verschiebung der Blutformel nach links, die Leukocytose in der Höhe von etwa 33 000 und vor allem die hochgradige Anämie.

Besonders hervorzuheben ist, daß an den Anhangsorganen des Urogenitalapparates, nämlich an der Prostata, den Samenblasen, den Cowperſchen Drüſen durch Betastung während des ganzen Krankheitsverlaufes ein sicherer Krankheitsbefund nicht erhoben werden konnte. Bei der Sektion ergab sich das Folgende:

Sektionsbefund.

Gonorrhoe.

Außeres: —

Rückenmark, Gehirn: —

Kreislauf: Subakute, schwere ulceröse, destruierende Endocarditis pulmonalis. Pericarditis fibrinosa purulenta exudativa. 180 ccm Dilatation, geringe Hypertrophie der rechten Herzkammer, starke Anaemie des ganzen Herzens.

Septische Embolie und Thrombose des unteren Hauptastes der rechten Lungenarterie mit diphter. Veränderungen der Arterienwand. Anschließend gutartige Thrombose bis in die feinsten sichtbaren Ästchen des rechten Lappens.

Respiration: Zahlreiche größere und kleinere, linken- bis Dreimarkstückgroße, septische Infiltrate mit gelbem Oedem im ganzen rechten Unterlappen. Beginnende Pleuranekrosen und pneum. Herde im Bereich der oedemat. Stellen. Sero-fibrinös-eitrige Mediastinitis. Oedem d. linken Lunge, das teilweise von ähnlicher, auffallend grün-gelber Farbe ist wie das der rechten Lunge.

Oesophagus, Magen, Darm: Oedem, starke Hyperaemie des Gaumens, der hinteren Rachenwand und der Gaumenbögen.

Lymphknoten, Milz: Subakute Hyperplasie der Milzpulpa und -knötchen, große, alte Käseherde in der rechten Bronchialdrüse.

Leber: Fibrinös. Perihepatitis, geringe peripherische Fettinfiltration der Leber, auch zentrale Verfettung und Stauung.

Nieren: Schwere, totale, fettige Degeneration, Oedem und Anaemie beider Nieren.

Urogenitalapparat: Chron. eitrige Urethritis, insbesondere des ganzen hinteren Drittels der Harnröhre. Verbreiterung der hinteren Urethral-Drüsen. Eiteransammlung in den Prostata-Drüsen, Oedem der hinteren Blasenwand und des ganzen cavum vesico-rektale.

Verschiedenes: 2 große foramina parietalia, schwere allgemeine Anaemie. Struma colloides.

Befprechung.

Die bekannteste Metastase einer gonorrhöischen Erkrankung, die Arthritis gonorrhöica, ist in ihrer vielgestaltigen Möglichkeit in der Regel auf Gelenke beschränkt, welche die meiste Beanspruchung erfahren. Es waren dies im vorliegenden Falle die beiden Handgelenke und das Kniegelenk. Nach einer Statistik von Finger und einer weiteren von Holzow werden übereinstimmend am meisten die Kniegelenke befallen. Die Erkrankung des Sterno-Costalgelenks wird als eine Seltenheit bezeichnet.

Das Verhältnis zwischen Poly- und Monoartikulärer Erkrankung beträgt nach Ravaut und Boulin 2:3. Dies ist wohl richtig, wenn man die Gelenkerkrankung bei Gonorrhoe überhaupt betrachtet. Bei der tödlich verlaufenden Gonokokkensepsis ist aber der Prozentsatz der polyartikulären Beteiligung gegenüber der monartikulären ein weitaus höherer.

Warum in einem Falle die serösen Gelenkhäute ergriffen werden, in einem anderen Falle nicht, wird wohl sicherlich durch das Bestehen einer gewissen Disposition von Seiten des Kranken mit bedingt sein, die in dessen Konstitution begründet ist. Im Falle M. Sch. ist anamnestisch bekannt, daß dessen Mutter schwer an Gelenkrheumatismus des öfteren erkrankt war. Wir wissen, daß es ein disponierendes Moment bei Gelenkerkrankungen gibt, und daß dieses Moment auch vererbbar ist.

Die Sterilität des Gelenkpunktes ist keineswegs beweisend gegen eine durch den Gonokokkus bedingte Arthritis. Nach den Untersuchungsergebnissen verschiedener Autoren ist der Erreger nach 6 Tagen bereits weder mikroskopisch noch kulturell nachweisbar. Andere, wie Chrostek und seine Mitarbeiter Rifack und Winkler glauben, daß die Gelenkerkrankungen bei Gc auf einer reinen Toxinwirkung beruhen.

Möglicher wäre, daß die Erkrankung des Schleimbeutels am Malleolus externus entstand durch Uebergreifen der Entzündung von den zuvor befallenen Sehnencheiden des Peroneus. In der weiteren Folge war es am gleichen Ort zu einem Mitbetroffensein des Periosts gekommen. Die Periostitis machte sich durch umschriebene Verdickung bemerkbar, in deren Bereich eine äußerst ausgeprägte Druckempfindlichkeit bestand. Ob es dabei durch Tiefer-schreiten der Entzündung zu einer Mitbeteiligung des Knochens und

einer Destruktion deselben gekommen ist, ist nicht ermittelt worden.

Morphologisch gibt es 2 Formen von Muskelerkrankungen. Die eine ist gekennzeichnet durch eine schmerzhafteste Rigidität, die andere beruht auf eitriger Einschmelzung der Muskulatur.

Bei unserem Kranken war eine durch Schwellung, Bewegungsbeschränkung und Schmerzhaftigkeit gekennzeichnete Erkrankung vorhanden, die, ohne zu eitriger Einschmelzung zu führen, sich wieder zurückbildete. Vorhanden war demnach eine interstitielle Myositis. Tendovaginitis war an verschiedenen Sehnen der Hand- und Fußmuskulatur vorhanden, wie aus dem Krankenblatt ersichtlich ist.

Die umschriebene Pleuritis, die ungefähr in der Mitte der Krankheit auftrat, bestand nur wenige Tage. Möglicherweise beruhte sie auf einer durch die Gc bedingten Embolie und Thrombose, zumal da Thrombosen durch die Sektion an anderer Lokalisation (Lunge) festgestellt wurden.

Die sich später einstellende Pneumonie ist wahrscheinlich nicht mehr in direktem Zusammenhang mit der spezifischen Infektion, sondern als eine infolge der beginnenden Herzinsuffizienz sich bildende Stauungspneumonie anzusehen.

Die Endocarderkrankung nimmt insofern in der Metastasenbildung eine Sonderstellung ein, als sie gewissermaßen das Schicksal des Kranken besiegelt, als Ausgangspunkt von weiteren Metastasen und septischen Embolien und als wichtigste Organerkrankung, die an sich schon das letale Ende herbeizuführen vermag. Man darf darauf hinweisen, daß die Prognose nach dem Befallensein des Endocards zum mindesten infauster ist.

Die Lokalisation an der Pulmonalklappe ist bislang sehr selten beobachtet worden. Rudolf Keller berichtet über einen Fall von maligner Endocarditis an den Klappen der Pulmonalis (ebenso Paul Durant). Daß sich in diesem Falle kurz vor dem Tode eine Pneumonie entwickelt, läßt sich durch die Erkrankung der Pulmonalklappe erklären, die insuffizient geworden ist.

Bemerkenswert ist, daß das remittierende Fieber und die Schüttelfröste erst nach dem Befallensein des Endocards beginnen. Ebenso ist das Auftreten der Purpura zeitlich abhängig von der Endocarderkrankung. Die Purpura selbst ist nicht so sehr selten nach der Generalisierung der Gonorrhoe und ist in den Arbeiten von R. Du-

bot, Finger, A. Mathieu und W. A. Philipps, Meyer und Franz Weiss eingehend beschrieben worden. Eine Besonderheit zeigt die Purpura im Falle M. S. nicht. Sie tritt lediglich in einem Haupt- und einem geringeren Nachschub auf, um dann wieder gänzlich zu verschwinden. Nach der Annahme Dubots wirken die Toxine auf die Nerven des Gefäßapparates, indem sie eine Erweiterung desselben und damit Blutaustritte aus den Gefäßen zur Folge haben, fernerhin kann man annehmen, daß die Gonokokken-Toxine am Orte der Haemorrhagien auf die Gefäßwand direkt schädigend wirken, wodurch es zu lokalen Blutungen kommen kann.

Bei den von Litten beschriebenen beiden Fällen deckt sich der eine mit unseren Beobachtungen, indem die Purpura erst nach vorhergegangener Arthritis im Knie- und Handgelenk vor allem erst nach einer Endocarditis am Mitralsegel auftrat. Im anderen Falle waren Gelenkerkrankungen, septische Milzschwellung die Zeichen einer embolischen Herdnephritis, Hämaturie, Eiweiß und Zylinder im Urin auch in diesem Falle schon vorhanden (und deuten auf eine Generalisierung des ursprünglich lokalen Prozesses hin). Daneben bleibt aber noch die Möglichkeit offen, daß die Endocarditis an der Mitralis schon bestanden hat, ohne daß sie klinische Zeichen hervorrief, zumal da die Milz- und vor allem die Nierenerkrankung eine Endocarderkrankung wahrscheinlich machen.

Im Gegensatz zu dieser Beobachtung und auch zu dem von uns beobachteten Fall steht das Krankheitsbild, das von Weiß beschrieben wurde. Bei der von Weiß mitgeteilten Beobachtung traten punktförmige, linsengroße und noch größere Hautblutungen an den unteren Extremitäten angeblich 5 Tage nach der Entwicklung einer Gonorrhoe auf, bei der Anterior und Posterior sowie Prostata ergriffen waren.

Daß die Purpura zuweilen ganz im Vordergrund einer Gonokokkensepsis stehen kann, beweist ein Fall von Holzow (zit. nach Janet-Asch), bei dem ein junges Mädchen mit der Diagnose Purpura zur Aufnahme kam.

Besonders gut werden wir über das Zustandekommen der Purpura bei Gc durch die Studien von Brungsaard und Thyotta unterrichtet. Bei den Kranken dieser Autoren stand die Purpura und die Meningitis im Vordergrund des klinischen Bildes. Die Meningitis bot sich dar unter den Erscheinungen einer leichten Ermüdbarkeit,

Kopfschmerzen, die beim zweiten Purpuraschub an Heftigkeit bedeutend zunahmen. Im Liquor wurden Gonokokken gefunden.

Eine Meningitis kam im Fall M. S. nicht zur Ausbildung, wenn auch manche Symptome die Diagnose meningeale Reizung rechtfertigten. Gegen das Erkranktsein der Meningen nach dem Bilde einer Meningitis spricht die rasche, ohne wesentliche therapeutische Maßnahmen erfolgte Heilung bzw. das Aufhören der Beschwerden, die auf eine Mitbeteiligung der Meningen hingewiesen hatten. Gesichert wird die ätiologische Bedingtheit der Meningitis durch den Nachweis der Gc im Liquor. Diagnostisch ist dieser Befund von großer Bedeutung, weil daraus ersichtlich ist, daß auch die Gc zur Ausbildung einer Meningitis führen kann. Der Beweis, daß es sich hierbei um Gc und nicht um Meningococcen gehandelt hat, ist besonders streng zu führen im Hinblick auf den Ort des Auffindens der Krankheitserreger. Ist doch die Differenzierung der Meningococcen und Gonococcen bei mikroskopischer Untersuchung kaum möglich. Die Lage der Erreger zueinander und ihr färberisches Verhältnis gegenüber Gram sind dieselben. Als Unterscheidungsmerkmal kann man vielleicht anführen, daß die Gc, mehr wie die Mc, vorwiegend intra-leukocytär liegen, jedoch kann dieser Punkt nicht entscheidend bei der Beurteilung zu Rate gezogen werden. Bei Anlegung strenger Maßstäbe kann eine Klärung darüber, ob eine Meningitis durch Gc oder Mc bedingt ist, nur durch Kultur erfolgen. Diese ergab im Falle Brunsgaard u. S., daß es sich um Gc handelte.

Die eigentliche Todesursache ist in dem hochgradigen Kräfteverfall, der unter anderem besonders deutlich in der ausgesprochenen sekundären Anaemie zum Ausdruck kommt, und dem Insuffizientwerden des Herzens und der gesamten Kreislauforgane zu suchen.

Fall II.

Name: F. S.

Kaufmännischer Angestellter

32 Jahre

Diagnose: GcSepsis (Endocarditis, Arthritis, Pseudoneuritis,
Hyperkeratose der Fußsohlen)

Familienanamnese: ergibt keine Besonderheiten.

Früher, als Kind, Windpocken.

Häufig Halsdrüsen-schwellungen beiderseits.

1912 erste Drüsenoperation.

1917 zweite Drüsenoperation.

1924 im Institut für Krebsforschung.

1922 Gc ohne Komplikationen.

November 1929 Ausfluß aus der Harnröhre mit positivem Gc-Befund, coitus extra muros wird negiert.

Ehefrau Gc-frei.

Der Kranke ließ sich nicht fortlaufend behandeln, entzog sich immer wieder der Behandlung.

1930 bis September ds. Js. Gc immer positiv.

Nach einer Motorradfahrt Auftreten von Schmerzen und Schwellung am kleinen und Ringfinger der linken Hand (seit 10. X. 30). Allmählich Anschwellen des linken Hand- und Ellenbogengelenks, unter Fieber und Schüttelfrost. Der behandelnde Arzt icht den Patienten zum Zwecke einer Röntgenaufnahme ins Urbankrankenhaus.

Am 12. IX. 30 keine pathologischen Veränderungen im Röntgenbild erkennbar.

Da keine Besserung des Zustandes eintrat, erfolgte Aufnahme in der chirurgischen Abteilung des Urbankrankenhauses (am 13. IX. 30), wo der Kranke bis zum 4. X. lag (unter der Diagnose Monarthritis gonorrhoeica). (Natr. salicyl 4,0.)

Die angewandte Therapie bestand in Bier'scher Stauung. In dieser Zeit Schüttelfrost, Fieber bis $40,6^{\circ}$. Die Schwellung ging zurück.

Am 4. X. trotz wieder bestehenden Fiebers und Schüttelfrostes auf eigenen Wunsch entlassen.

Da keine Besserung eintrat, am 9. X. erneute Aufnahme im Urbankrankenhause (Innere Abteilung). Die Schwellung der linken

Hand ist erheblich geworden. Die Temperatur beträgt bis 40°.

SR. zweifelhaft. Lumbalpunktion negativ.

Blutkultur blieb steril.

Am 14. X. 30 wird eine Pleuritis ohne wesentlichen Erguß festgestellt.

Therapie: Argochrom, Gonoflavin, Trypaflavin.

Am 30. XI. wird der Kranke auf Wunsch entlassen.

In der Zwischenzeit zu Hause.

Da keine Besserung eintrat, am 16. XII. 30 Aufnahme in die Universitäts-Hautklinik der Charité.

Das Röntgenbild ließ am 13. X. 30 fleckige Atrophie im Bereich der linken Handwurzel erkennen. Die Intracarpal und Carpometacarpalgelenke sind größtenteils bis zur Unkenntlichkeit verschwollen. Es muß angenommen werden, daß der entzündliche Prozeß bereits zur Zerstörung des Gelenkknorpels geführt hat. Im Bereich des proximalen Gelenks des 2. Metacarpale deutliche Knochendestruktion.

17. XII.

Status praesens.

Mittelgroßer Mann in gutem Entwicklungs-, aber mäßigem Ernährungszustand. Eingefallenes Gesicht, Hautfarbe gelblich, Schleimhäute blaß.

Augen: Pupillen reagieren auf Licht und Convergenz.

Mund, Rachen, Hals: o. B.

Zähne: o. B.

Lunge: Grenzen normal, gut verschieblich. Rechts hinten aber leichte Dämpfung. Ueberall vesiculäres Atemgeräusch.

Herz: Grenzen rechts einfingerbreit über den Sternalrand reichend.

Hebender Spitzenstoß einfingerbreit außerhalb der Mamillarlinie. Herzaktion unregelmäßig. Deutliches systolisches Geräusch an allen Ostien, besonders über der Aorta. P₂ accentuiert.

Abdomen: Leber überragt etwas den Rippenbogen.

Milz: palpabel, weich.

Genitale: Aus der Harnröhre spärliches Sekret. Urin I./II. klar.

Adnexe: o. B.

Nervensystem: Reflexe gesteigert.

Haut: An beiden Halsseiten, am Unterkieferwinkel symmetrisch, kleinhandtellergröße, ziemlich scharf begrenzte teleangiectatische Herde.

Auffallend starke Hyperkeratose an beiden Fußsohlen.
Handteller normal.

Extremitäten: Flexionsbewegung des linken Handgelenks gehemmt, ebenso die der Articulatio Carpo-Metacarpale. Ganze linke Hand macht im Vergleich zur gefunden einen atrophischen Eindruck. Die Haut fühlt sich welk an und ist aschgrau gefärbt. Der linke Ellenbogen ist normal beweglich.

Liquoruntersuchung im Urbankrankenhaus laut Krankenblatt negativ.

Der Gc-Wassermann ist jetzt vierfach positiv.

Blutdruck beträgt 120/60.

Blutstatus: Erythrocyten: 4 000 000

Leucocyten: 10 500

Hbg: 60 %

— 1 / — — 8,71 / 17,3.

Nach Anlegung von Blutkulturen blieben diese steril.

Urin: Albumen spärlich, Sediment: Leucocyten ++; vereinzelte Erythrocyten.

Temperatur: 37°.

Diagnose: Gonococcensepsis, Endocarditis und Arthritis, gonorrhoea, Hyperkeratosis plantarum.

Therapie: Gonococccen Vaccine.

18. XII. 30:

Temp. 36,5°; Therapie: Gc Vaccine 10 ccm subcutan.

Schüttelfrostattacken, der Kranke ist auffallend euphorisch.

Blutbild: — 1 / — — 8,71 / 17,3.

20. XII. 30:

Innerhalb von 12 Stunden trat ein nochmaliger Schüttelfrost auf. Die Temperatur schwankte zwischen 38° bis 40°.

Das systolische Geräusch ist heute nur noch über der Aorta deutlich zu hören. Ueber den Lungen rechts hinten, oben wird eine geringe Dämpfung festgestellt. Das Atemgeräusch ist überall vesikulär.

Urin: spärlich Albumen. Im Sediment werden gefunden: hyaline Zylinder, granulierte Zylinder ++, Leucocyten ++, Erythrocyten.

Therapie: 3 × täglich 10 Tropfen Cardiacol; 5 × täglich 0,1 gr Chinin; Eisbeutel auf Herzgegend; Verodigensuppositorien.

23. XII. 33:

Temperaturen bis 40 °; täglich treten Schüttelfröste auf, während deren Verlauf der Kranke sich sehr elend fühlt. Sonst ist er auffallend euphorisch. Das systolische Geräusch ist seit zwei Tagen stärker geworden und besonders deutlich über der Aorta. Der Puls ist unregelmäßig, aber voll und kräftig.

Es wird im Schüttelfrost erneut Blut entnommen.

Der Kulturversuch auf Ascitesbonillon, auf der Schottmüller- und Löwenthalplatte verläuft negativ, die Nährböden bleiben steril.

Die Temperatur ist jetzt im Durchschnitt 38 °; Pulszahl 105. Im Urin geringe Spuren von Eiweiß, Leukocyten +, Erythrocyten +; granuliert Zylinder +; es werden weiter Gc Vaccine gespritzt.

24. XII. 30:

Der letzt aufgetretene Schüttelfrost war nach Krankenangabe weniger heftig und kürzer.

Blutbild: — 1) — 9,74 / 12,4).

27. XII. 30:

Therapie: Gc Vaccine; Temp. 39,4 °.

Herzgeräusche wechseln sehr in ihrer Stärke.

Allgemeinbefinden gut, leichte Schüttelfröste.

29. XII.:

Gestern Temp. 40,7 °, Puls kräftig 100.

Heute Temp. 30,5 °.

Rechts hinten unten Schallverkürzung. Feine Rasselgeräusche hörbar.

30. XII. 30:

Eine Zunahme der Dämpfung ist zu beobachten. Der Kranke klagt über starken Husten, bei dem sich etwas schleimiger Auswurf entleert.

Hgb. 50 %, Blut — 11 — 23,62 / 10,5.

31. XII. 30:

Rechts hinten unten eine handbreite Schallverkürzung mäßigen Grades mit einzelnen mittelblasigen, klingenden Rasselgeräuschen. Rechts vorn zahlreiche Rasselgeräusche im In- und Expirium. (Pleur. Reiben.) Deutliche Schallverkürzung rechts vorne. Die Herztöne sind etwas verschwommen. Das systolische

Geräusch ist etwas schwächer hörbar, am stärksten über der Aorta.

Nervenzustand: Bauchdeckenreflexe links schwächer als rechts, leicht erschöpfbar. Desgleichen Cremasterreflex. Patellarreflex rechts und links gesteigert. Achillessehnenreflex rechts und links gesteigert, leicht erschöpfbarer Fußklonus beiderseits.

Oppenheim links.

Stechen in der Brustgegend.

Diagnose Dr. Hall: Bronchopneumonie, Pleuropneumonie.

Auswurf schleimig, eitrig, etwas blutig.

Therapie: Dicodid, Transpulmin, Leber.

1. I. 31:

Weiterhin starker Hustenreiz vorhanden, der bis zum Erbrechen führt. Temperatur 38,8°. Seit dem 30. XI. 30 ist kein Schüttelfrost aufgetreten.

3. I. 31:

Hgb 50 %, Leberdiät.

Urin Alb: +; granulierte Zylinder; Leuco ++; Ery. +++.

4. I. 31:

Die feuchten Rasselgeräusche hinten unten links sind nicht mehr, rechts nur noch vereinzelt hörbar, deutlich daneben Gemen und Schnurren.

5. I. 31:

Codein wegen Hustenreiz.

6. I. 31:

Immer noch starker Hustenreiz. Beim Husten wird ein schleimiges Sekret entleert.

Er. 3 080 000, Leuc. 6 200, Hgb. 50 %.

— / — 12,58, / 22,8 /

Wegen bestehender Pneumonie wurden Gc Vaccine abgesetzt. Vom 31. I. bis heute erhielt der Kranke stets 1 ccm Gc-Vaccine zwecks Vermeidung eines anaphylaktischen Schocks.

8. I. 31:

Die Sputumuntersuchung ergab Pneumokokken vom Typ 2. Rechts sind vereinzelte feuchte Rasselgeräusche noch hörbar, ebenso pleuritische Reiben.

9. I. 31:

Allgemeinbefund der gleiche Status.

Therapie: Gc Vaccine.

12. I. 31:
Puls weich, leicht unterdrückbar. Abends bekommt der Kranke
Oleum camphoratum.
13. I. 31:
Ueber der Aorta hört man jetzt ein systolisches und diastolisches Geräusch. An den übrigen Ostien keine Geräusche.
15. I. 31:
Transpulmin abgesetzt.
16. I. 31:
Gc Vaccine.
Blutsenkungsgeschwindigkeit 107,
erste Stunde 180, zweite Stunde 147.
17. I. 31:
Jeden 3. Tag Acid. hydrochloric.
19. I. 31:
Urin: Alb. spärlich, Gr. Z. +, Er. ++, L. ++
Hgb. 60 %, Leuc. 7200.
— 4 / — — 7,55 / 29,5 /
22. I. 31:
Allgemeinbefund gut. Unregelmäßige Herzaktion.
Puls wieder unregelmäßig.
23. I. 31:
Auskultatorisch Aorteninsuffizienz.
Hgb. 67%, Leuc. 6.100, Erytr. 3,7, Index: 0,9.
— 4 / — — 4,57 / 31,5.
26. I. 31:
Patient klagte gestern über Kopfschmerzen.
Temp.: 37,5 °. Unrein 1. Aortenton.
27. I. 31:
Intermittierende Temperatur 38,2 °. Ueber der Aorta ist deutlich ein systolisches Geräusch zu hören.
28. I. 31:
Temperatur: 38 °; gegen 12 Uhr 39,2 °, sehr matt, nachts stark geschwitzt. Subcutan 2 ccm, Gc Vaccine zwecks Vermeidung des anaphylaktischen Schocks. Deutliches systolisches und diastolisches Geräusch über Aorta, schwächer an den übrigen Ostien.
Blutbild: — 3 / — 14,45 / 33,5 /
Urin wie oben.

29. I. 31:

Restliche 8 ccm-Vaccine werden gegeben.

2. II. 31:

Allgemeinbefund gut. Leichte Schallverkürzung rechts unten. Keine Rasselgeräusche. Geräusch an Aorta schwächer, Puls kräftig, Temperatur 38,2 °, Gc-Vaccine 10 ccm.

5. II. 31:

Heute Vormittag Temperatur. Während des Mittags plötzliches Auftreten von Schüttelfrost von 5 Minuten Dauer.

Temperatur stieg auf 39,4 °.

Blutstatus L 7200, Hbg. 60 %, Er. 4,5.

Seit 5. 2. 31 deutliche Sepsis-Kurve, Temperatur 40,1 °.

Blutdruck 110/65.

16. II. 31:

Durchleuchtung ergab: Herzschatten auffallend, keulenförmig durch flache Verbreiterung seiner Basis. Rechter Herzanteil erscheint etwas verbreitert, der linke auffallend gerundet. Der Pulmonalisbogen springt deutlich hervor.

Lunge zeigt keine Veränderungen.

Röntgeninstitut der Chirurgischen Universität Charité,
Vorstand Prof. Dr. Chaoul.

6. I. 31:

Geräusche über der Lunge fast verschwunden, aber noch starker Hustenreiz. Wieder vorsichtiger Beginn der spez. Behandlung. Zunächst 3 ccm Gc-Vaccine wegen der Gefahr eines anaphylaktischen Schocks.

16. I. 31:

Therapie Gc Serum. Seit dem 6. I. ist Patient fieberfrei. Allgemeinbefinden gut. Die Keratose an den Fußsohlen ist im Fortfall begriffen. Die Hornlamellen beginnen sich zu lösen. Zur Kräftigung Astonin.

23. I. 31:

Keinerlei septische Erscheinungen mehr. Ueber der Aorta deutliches diastolisches, weniger ausgeprägtes systolisches Geräusch. Die Erscheinungen an den Fußsohlen sind völlig verschwunden.

28. I. 31:

Seit 4 Tagen hat Patient wieder intermittierendes Fieber bis 38,2. Da neuer septischer Schub zu erwarten ist, Fortsetzung der spez. Therapie. An allen Ostien wieder systolisches und

diastolisches Geräusch hörbar, am deutlichsten an der Aorta.
Blutbild: — 3 / — 14 45 / 33 5 / . Urinbefund: Alb. spärlich,
Sediment: reichlich Leukocyten, Erythrocyten ++.

5. II. 31:

Patient bekam nach zweitägigem fieberfreien Intervall heute mittag wieder Schüttelfrost, der 5 Minuten dauerte, danach Fieber bis 39,5. Um den erneut einsetzenden Prozeß endgültig zu beseitigen, wird nunmehr konsequent Gc-Serum-Behandlung durchgeführt.

11. II. 31:

Befinden subjektiv gut, Aussehen kachektisch.
Weiter Serumbehandlung, Cardiaca + Chinin.

16. II. 31:

Patient ist seit drei Tagen fieberfrei und wird auf Wunsch gegen ärztlichen Rat entlassen, jedoch ambulant spezifisch weiter behandelt.

Untersuchung am 28. 3. 31. Patient gibt an, in den 6 Wochen seit seiner Entlassung kein Fieber mehr gehabt zu haben. Allgemeinbefinden gut.

Die innere Untersuchung ergibt am Herzen auskultatorisch keine Geräusche, perkutorisch eine leichte Verbreiterung nach rechts, an den Lungen perkutorisch wie auch auskultatorisch normaler Befund. Gc-Seroreaktion +++++. Blutstatus: Er. 3,85, L. 6000, Hb. 74 %, — 4 / — — 7,47 / 36,6. R. R. 110 / 65.

Der Kranke kommt am 15. IV. zur nochmaligen Herzuntersuchung. Die Röntgenaufnahme ergibt das folgende Bild:

15. IV. 31:

Am Cor fällt breite Basis, Vorspringen des Pulmonalbogens, vielleicht etwas verstärktes Vorspringen der rechten Herzbegrenzung auf. An der Lunge befindet sich ein Interlobärschatten zwischen rechtem Ober- und Mittellappen. Sonst auf der Lunge keine Veränderungen.

F. S. gibt auf Befragen an, daß er sich subjektiv wohl fühle. Schüttelfröste sind nicht mehr aufgetreten. Er wird gebeten, sich gelegentlich wieder vorzustellen.

Befprechung.

Dieser Fall von Gonococcensepsis unterscheidet sich insofern von den übrigen beschriebenen, als zwischen der Infektion und dem Auftreten der Fernkomplikationen eine Zeitspanne von zwölf Monaten lag. Das positive Ergebnis der mikroskopischen Untersuchung des Urethralessekrets während der 11 Monate stellt jedoch den kausalen Zusammenhang dar. Eine stattgefunden Motorradfahrt des Kranken wirkte als Provokation der Urethralgonorrhoe und ist damit zugleich der Beginn der Generalisierung der zuerst lokalen Erkrankung. Auch bei ihm ist auf die Anfälligkeit der Tonsillen und der Lymphdrüsen, wie sie anamnestisch festgestellt wurde, hinzuweisen und man kann auch hier von einer Art von Lymphatismus sprechen. Die Gonokokkensepsis beginnt bei diesem Kranken am linken Hand- und Ellenbogengelenk. Eine Röntgenaufnahme der Gelenke am 12. IX. läßt keine pathologischen Veränderungen erkennen, während schon durch eine erneute Photographie am 13. X., also 4 Wochen später, Veränderungen in Gestalt einer fleckigen Atrophie im Bereich der linken Handwurzel und Verschmälerungen der Intracarpal- und Carpometacarpalgelenke bis zur Unkenntlichkeit sichtbar werden. Es bezeugt dies, daß der entzündliche Prozeß bereits zur Zerstörung des Gelenkknorpels und zur Knochendestruktion im Bereich des proximalen Gelenks des zweiten Metacarpus geführt hat. Eine derartig weitgehende Zerstörung ist als ein verhältnismäßig seltener Ausgang einer gonorrhoeischen Gelenkaffektion zu bezeichnen. A Léri beschreibt Formen von Ostitis gonorrhoeica und betont dabei, daß eine nicht eitrige Form, wie dies auch hier der Fall war, die häufigere ist. Nach der Typeneinteilung von König reiht sich dieser Vorgang unter die als Type II bezeichnete Knochendestruktion ein.

Am Endocard, das bald nach der Metastasierung in den Gelenken betroffen wird, ist der Sitz der Erkrankung das Mitralfelg, es bildet sich die reine Form einer Mitralinuffizienz heraus, mit den typischen klinischen Symptomen derselben.

Auffallend ist ferner eine hochgradige Hyperkeratose der Fußsohlen, während die Handteller beiderseits normale Verhornung aufweisen. Nach der sechsten Serumsinjektion am 16. I. 31 beginnen sich die Hornlamellen aufzulösen und die gesamte Hornschicht zerfällt. Die Parakeratose ist in verschiedenen Fällen im Zusammenhang mit Gonococcensepsis zur Ausbildung gekommen

und man hat ihre Entstehung auf die spezifische Wirkung von Gonokokkentoxinen zurückgeführt und daneben eine pathologische Disposition angenommen. Für letztere spricht das fast ausschließliche Auftreten dieser Effloreszenz bei Männern. Eine Muskelatrophie an der linken Hand ist wohl nur auf die Inaktivität derselben zurückzuführen. Auch von diesem Kranken wurden Blutkulturen angelegt, die steril bleiben, während der Gonokokkenwassermann fünffach positiv war.

Die in der Mitte der Krankheit auftretende Broncho-Pleuropneumonie war atologisch unabhängig von dem Grundleiden, was sich in der Unbeeinflusstheit durch spez. Therapie und dem positiven Nachweis von Pneumokokken vom Typ II im Sputum nachweisen ließ.

Das verabfolgte Gonokokkenserum ergab einen vollen Erfolg. Bereits nach der ersten Injektion desselben nahmen die quälenden Schüttelfröste an Zahl und Intensität rasch ab und waren nach der dritten Injektion beseitigt. Nach 14 Tagen begann eine fieberfreie Periode und die gonorrhöischen Erscheinungen waren weitgehend gebessert. Infolge dieses verblüffenden Erfolges wurde die spec. Behandlung nach der 7. Spritze unterbrochen, allerdings, wie sich zeigte, zu früh. Es folgte ein zweiter septischer Anfall, der jedoch milder verlief und durch die nunmehr konsequent durchgeführte Behandlung vollständig beseitigt wurde.

Der Patient konnte am 16. II. 31 als geheilt entlassen werden und diese Heilung blieb bis zum heutigen Tage konstant.

Fall III.

Krankengeschichte J. K., Student.

Diagnose: Gc-Sepsis nach akuter Gc.

Monarthritis und Epididymitis, Endocarditis.

Familienanamnese: o. B.

Perf. Anamnese: Nur Kinderkrankheiten.

Am 12. November, vier Tage nach der Infektion, Harnröhrenausfluß.

Am 14. XI. vom Spezialarzt Albargin verordnet 3 mal täglich. Der Ausfluß wird geringer, ebenso nimmt die Prostatitis ab. Vor Weihnachten im Abstrich keine Gonococcen, ebenso nach Weihnachten.

Am 30. XII. traten plötzlich Schmerzen im linken Handgelenk auf. Der Patient wird in der Universitätsklinik stationär behandelt. Jetzt noch etwas Ausfluß, leichtes Brennen beim Wasserlassen, kein Harndrang.

30. XII.: Status: Der Kranke ist ein großer, sehr kräftig gebauter Mann in gutem Ernährungszustand. Die Untersuchung der inneren Organe ergab keinen krankhaften Befund. Der Patient hat einen Kropf.

Extremitäten: Die linke Mittelhand vom Handgelenk bis zum Mittelhandfinger gehend ist teigig verdickt und zeigt starken Druckschmerz und Rötung.

Umfang des linken Handgelenks: 22 cm, r. Handgelenk 18 cm, Umfang der linken Fingergelenke: 24 cm, r. Fingergelenke 22 cm. Eine aktive Bewegung des linken Handgelenks ist dem Kranken nicht, die passive Bewegung nur mit starker Schmerzauslösung möglich.

Urethra: Das Orificum, aus dem sich auf Druck geringes eiteriges Sekret entleert, ist leicht gerötet, nicht geschwollen.

Der Urin im ersten Glas ist trüb, das zweite Glas enthält klaren Urin. Im Urethralsekret werden nachgewiesen:

Gc.: +++ : EK. +++ : Ep. ++ : Bk. —

Der Samenstrang zeigt keine Veränderung. In der Prostata lassen sich im rechten unteren Lappen kleinbohnengroße Verhärtungen tasten. Die rechte Samenblase wird als prallgefüllter Tumor gefühlt.

Temperatur 38,5°.

Therapie: Bettruhe, Heißluft, Stauen, Tee.

Der Urin ist am 5. I.: I. trüb, II. klar.

Im Urethrafsekret: Gc. ++, Ek. +++, Ep. ++, Bk. —

7. I.:

Die Schwellung des linken Handgelenks zeigt eine geringe Abnahme, auch find Bewegungen unter der Staubinde wieder besser ausführbar.

Die Temperatur ist auf 38° heruntergegangen.

Es wurden 25 Mill. Keime Gonargin intravenös injiziert.

8. I.:

I. trüb, II. trüb.

Im Urethrafsekret: Gc. +, Ek. ++, Ep. +, Bk. +

9. I.:

Wiederum Verabfolgung von 25 Mill. Keime Gonargin.

10. I.:

Wohl als Folge der Gonargininjektion ftieg das Fieber auf 39,8° (am Abend). Es wird eine etwa pflaumengroße, nur geringe schmerzhaftc Anfschwellung des Schwanzteiles vom rechten Nebenhoden festgestellt.

13. I.:

Temperatur 38,8 — 39,7°.

14. I.:

Der Krankheitszustand ist unverändert. Bei der Herzuntersuchung hört man zum ersten Male ein lautes systolisches Geräusch, das Herz selbst ist nach rechts verbreitert. Nach der Temperatursteigerung oder infolge der Einwirkung der Gonargins verschwinden die Gc. im Urethrafsekret.

15. I.:

Das Allgemeinbefinden des Kranken hat sich plötzlich am Morgen verschlechtert. Es bestehen heftige Atembeschwerden, der Kranke ist cyanotisch. (Puls klein — weich 160). Das Sensorium des Kranken ist getrübt, der Kranke selbst ist sehr unruhig und schwitzt sehr stark. Kurz nach der Untersuchung erfolgt der Exitus.

Therapie: Coffein, Digitalisat; 10 ccm Campfer.

Bei dem jugendlichen Kranken kam es etwa in der 10. Woche nach der Infektion zum Auftreten einer Monarthrits im linken Handgelenk, nachdem schon die anfangs bestehende gonorrhöische Urethritis und Prostatitis abgeklungen erschienen und 8 Tage hindurch in den Sekreten keine Gc. mehr nachzuweisen waren. Mit der Ausbildung der Monarthrits aber ging ein Aufflammen der Gonorrhoe im Urogenitalsystem einher. Die Anhangsorgane waren zu diesem Zeitpunkt gleichfalls beteiligt. Waren doch bei der Klinikaufnahme im Urethralsekret wieder Gc. nachweisbar. Im Bereich der Prostata waren einige kleinbohngroße Verhärtungen in beiden Lappen zu tasten und die rechte Samenblase bot sich als prallgefülltes Gebilde dar. Auf symptomatische Behandlung mit Heißluft und Stauung klangen die Entzündungsercheinungen im Handgelenk ab. Drei Tage danach entwickelte sich entsprechend der im Beginn der Aufnahme gefundenen Erkrankung der Samenblase eine rechtsseitige Epididymitis. Weitere 4 Tage später machte sich das Mitbefallen sein des Endocards durch Auftreten eines lauten systolischen Geräusches und einer Verbreiterung des Herzens nach rechts, sowie durch eine Verschlechterung des Allgemeinbefindens bemerkbar. Unter Trübung des Sensoriums, einer zunehmenden motorischen Unruhe und unter starkem Schweißausbruch, sowie unter Ausbildung einer Cyanose und einer Pulsbeschleunigung bis auf 160 Schläge in der Minute erfolgte ziemlich plötzlich der letale Ausgang.

Wiederholte Verabfolgung von Gonokokken-Vaccine (Gonargin 25—50 000 000 Keime) konnte keinen günstigen Einfluß auf den Krankheitsverlauf erzielen. Mit Auftreten der Metastasierung am Endocard führte die remittierend verlaufene Temperaturkurve zur Steigerung bis auf 40°.

Von den schweren Veränderungen, die die gonorrhöische Sepsis vor allem am Endocard gesetzt hatte, gibt uns der Sektionsbefund Aufschluß.

Sektionsbericht.

K. J.

15. I. 23. Skt. Nr. 68/23 Arndt P. M. 20

Urethritis gonorrhoeica ant. et. post.

Epididymitis gc. dextra. Arthritis gc. im linken Handgelenk.

Recid. ulcerös, phlegmonöse Endocarditis Mitralis et Aortica mit Perforation zweier Semilunarklappen und des befallenen Mitralsegels. Hypertrophie d. l. Ventrikels. Vollkommene Mitral- und Aorteninsuffizienz. Hochgradige Stauungsveränderungen: Stauungshyperämie und Oedem der Lungen, Stauungshyperämie der Leber, der Milz, der Nieren und des Darms. Pulpaschwellung der Milz, haselnußgroßer, subpleuraler tbc. Herd an der seitlichen Wand des linken oberen Lappens. Struma nodosa mit Hämorrhagien, zentr. Kalkeinlagerungen und Nekrose vornehmlich rechts. Schwellung des lymphatischen Rachenrings, des trachealen und bronchialen, sowie der mesenterialen Lymphknoten und der Follikel der Milz. Pröpfe in den Lakunen der Gaumentonsillen. Leichte Erweiterung des Unterhorns des rechten Seitenventrikels unterhalb des corpus striatum.

Epikrise.

Der Sektionsbefund bestätigt in allem den klinischen Befund und deckt weiterhin neben der bei Lebzeiten beobachteten Struma nodosa und neben dem hypertrophischen lymphatischen Rachenring eine weitgehende Vergrößerung des gesamten lymphatischen Apparates auf.

Wie dieser Fall zeigt, ist die Erfahrung der erhöhten Disposition lymphatischer Individuen für gonorrhoeische Gelenkerkrankungen auszudehnen auf die Möglichkeit der Generalisierung der gonorrhoeischen Infekte bei lymphatischen Individuen. In unserem Falle waren ebenfalls zuerst die Gelenke befallen, worauf sich aber bald die Endocarderkrankung entwickelte. Ob und inwieweit das Herz infolge der bestehenden Struma eine Schädigung erfahren hatte, kann nur vermutungsweise angenommen werden, eine solche Schädigung hatte aber zweifellos die Endocarderkrankung begünstigt. Die Vermutung wird nur durch die Tatsache wahrscheinlicher gemacht, daß in diesem Falle die Herzinsuffizienz als die letale Ursache sehr früh eingetreten ist.

Dieser Befund erscheint im Hinblick auf die Erfahrungen von Gantenberg und Sandmann bei gonorrh. Gelenkerkrankungen äußerst bemerkenswert. Diese Autoren wiesen auf die Wechselbeziehung zum lymphatischen Rachenring und Beteiligung der Gelenke bei Metastasierung der Gc. hin, indem sie sich für eine Disposition des lymphatischen Typs für die genannte Komplikation aussprachen.

Der hier beobachtete Fall ist eine Bestätigung bestehender Wechselbeziehung zum Lymphatismus und Generalisierung der Gonorrhoe nach erfolgter Infektion. Man muß dementsprechend in Zukunft mehr die Frage studieren, ob und inwieweit im Lymphatismus eine Bedingung gegeben ist, die förderlich ist für die Generalisierung der Gc und der daraus sich evtl. ergebenden schweren Verlaufsweise.

Ob in unserem Fall die Lokalisierung am Herzen und der foudroyante Verlauf der Krankheit nach Ausbildung der Endocarditis in Beziehung zu bringen ist zu der Struma und zu einer daraus vorher entstandenen Herzschädigung, wäre an Hand ähnlich gelagerter Beobachtungen weiter zu prüfen.

Fall IV.

M. U., Heizer, 37 Jahre.

Aufgenommen 1. Oktober 1932,

verlegt nach der Medizin. Station Männer A 12. XI. 32.

Diagnose Gc ant. et. post?

Arthritis + Tendovaginitis — Endocarditis.

Embolie mit nachfolgender Fußgangrän.

Familienanamnese: Eltern tot, Mutter † an Herzschlag.

Eigene Anamnese: Als Kind hatte der Kranke Masern, Scharlach, Keuchhusten. Im Kriege war er zweimal verschüttet, ohne nachträgliche Folgen. Vor 2 Jahren traten Beschwerden in der linken unteren Thoraxhälfte auf, die von einem Arzt als mit dem Herzen zusammenhängend aufgefaßt wurden. Im Anfang September zog sich Patient eine Gonorrhoeinfektion zu. Im Ausfluß Gonococci positiv. Seit dieser Zeit wird der Kranke vom Kassenarzt behandelt. Nach drei Wochen trat eine Schwellung des rechten Handgelenks mit hauptsächlichlicher Lokalisation im Bereich des Metacarpophalangealgelenks IV auf. Dazu gesellte sich einige Tage später eine Schwellung des linken Fußrückens mit Schmerzen und Rötung. Stationäre Behandlung: An der Universitäts-Hautklinik wurde der Kranke zur stationären Behandlung eingeliefert.

1. X. 32 Status:

Der Kranke ist mittelgroß, in einem ziemlich guten Ernährungszustand. Die Haut und die sichtbaren Schleimhäute sind gut durchblutet. An den Schleimhäuten des Mundes und Rachens sowie an den Tonsillen ist kein krankhafter Befund festzustellen.

Herz und Lungen sind klinisch gesund, ebenso das Zentralnervensystem.

Die Urethra ist am Orificium externum etwas gerötet, es besteht kein Ausfluß.

Bei der Untersuchung von Hoden und Nebenhoden erwiesen sich beide klinisch als nicht verändert.

An der rechten Hand ist im besonderen die Umgebung des 4. Fingergrundgelenkes gerötet und geschwollen. Die Bewegungen sind beschränkt und schmerzhaft. Eine etwas geringere

Schwellung und Rötung weist das linke Zehengelenk auf; hier strahlen die Schmerzen bis zum Oberschenkel aus. In der linken Inguinalbeuge ist eine bohnen große Drüse tastbar.

Diagnose: Arthritis und Tendovaginitis gonorrhoeica.

Therapie: Ichthyolfalbenverbände 20 %, Lichtbogen, Stauung, Neotropin.

2. X. 32:

WaR —; S. G. —; Gc.-Serumreaktion ++.

4. X. 32:

Temperatur 36,5 ° auf 40,0 ° gestiegen, dann wieder abfallend auf 36,5 °.

6. X. 32:

Blutdruck R/R 140/80. —

10. X. 32:

Der linke Fußrücken ist abgeschwollen, zeigt keine Rötung mehr und die Bewegungsmöglichkeit der Zehen, auch der 4. Zehe ist nicht mehr beschränkt und schmerzlos. Am rechten Handgelenk besteht die Schmerzhaftigkeit der Finger im besonderen bei Bewegungen weiter.

10. X. 32:

Temperatur 39,5 °. Im Durchschnitt in den vorhergehenden Tagen Höchsttemperatur 39,0 °.

Therapie: Ichthyolverband, Wattverpackungen.

12. X. 32:

Es wird eine kleine Erosion an der Glans Penis festgestellt, die mit Dermatol behandelt wird.

26. X. 32:

Die Blutuntersuchung ergibt als Hämoglobinwert 83 %; Blutdruck 135/75. Erythrocyten 4 450 000, Leucocyten 12 200.

Therapie: Arthigon.

27. X. 32:

Das unter dem 10. X. angegebene Zustandsbild besteht weiter. Es ist weder eine Besserung noch eine Verschlechterung der Beschwerden am rechten Handgelenk eingetreten.

Arthigon 1 ccm.

31. X. 32:

Die Fieberkurve, die bislang zwischen 37 ° und 38,5 ° (39) geschwankt hatte, zeigt jetzt Kurven bis 39,5 ° und 40 °.

Blutstatus: Haemoglobin 76 %, Erythrocyten 4 140 000,
Leucocyten 15 600, — / — — 9,60; 27,3.

2. XI. 32: Gc. W. + + + +

7. XI. 32: Die Gelenkbefschwerden sind vollständig und ohne Hinterlassung einer Bewegungsbefchränkung abgeheilt. Die Herzuntersuchung ergab bisher nicht das Vorliegen von Krankheitszeichen, läßt aber jetzt eine Verbreiterung des Herzens nach rechts aufdecken, sowie ein systolisches Geräusch, das an der Herzspitze am deutlichsten hörbar ist. Die Leber ist derber fühlbar und überragt dreifingerbreit den Rippenbogen. Die Milz ist nicht tastbar. Blutdruck 140/180.

Im Fieberanfall werden Blutkulturen auf Gonococcennährböden angelegt, die jedoch steril bleiben.

Blutstatus: Haemoglobin 71 %, Erythrocyten 3 830 000,
Leucocyten 13 000.

Therapie: Subcutane Einspritzung von Gc.Serum 10 ccm;
dreimal täglich 10 Tropfen Cardiazol;

zweimal täglich Chinin 0,5 gr.

(Serum bis zum 10. XI. ebenso Cardiazol.)

8. XI. 32: Bei der Herzauscultation findet sich ein systolisches Geräusch über allen Ostien.

10. XI. 32: Keine Veränderung des Krankheitsbildes.

Die subcutane Injektion des Gc.Serums wird fortgesetzt.

Die Temperatur schwankt zwischen 38 ° und 39,9 °.

Blutstatus: Haemoglobin 68 %, Erythrocyten 3 700 000,

Leucocyten 24 800, St. 15 S. 52, L. 38 Mo. 3.

Blutkenkung 1. Stunde 110, 2. Stunde 124.

12. XI. 32: Der Kranke wird nach der Medizinischen Klinik verlegt. Status: aschgraue Gesichtsfarbe evtl. Subikterus, Zunge feucht, nicht belegt.

Herz: r. d. r. Sternalwand nicht überschreitend, links innerhalb der Mamillarlinie. Systolisches Geräusch an der Spitze. Puls gut gefüllt, regelmäßig.

Nervensystem ohne Befund.

Senkung: 1. Stunde 60, 2. Stunde 110.

Urin: Albumen leicht vermehrt. Urobilin: — Indican: —

Sediment einige Leucocyten. Epithel. Oxalate.

R / R 120 / 60

- Blut: Haemoglobin 63 %, F. J. 1,0, Erythrocyten $3/89\ 000$,
Leucocyten 16 900, 1/1 — 1/27/49/16/5.
16. XI. 32: Wa.R. 0 / Bilirubin im Blut 0,45 mg %.
19. XI. 32: Leucocyten 15 100.
D. B.: — 2 / — — 18/59/18/3.
Patient hatte alle 2 Tage Gonococcenferum bekommen, 3 mal.
An der Beugeseite des linken Unterarms ein Serumexanthem,
das aber schnell abklingt.
20. XI. 32: Erneutes Auftreten von Gelenkschmerzen in beiden
Händen, Ichthyolverbände.
23. XI. 32: Der Kranke gibt Kribbelgefühl im linken Unterschenkel
an und hat große Schmerzen bei Bewegung desselben. An-
nahme des Vorliegens einer septischen Embolie.
24. XI. 32: 10 ccm Atophanyl 10 mal.
Alle drei Stunden eine Tablette Amido-phenazol.
Mixtura solvens.
23. XI. 32: D. B. — II — I, 24, 50/17,7.
Leucocyten 14.200.
25. XI. 32: D. B. — // — — 27,48 / 16,8.
26. XI. 32: Befinden unverändert.
27. XI. 32: Rechts hinten unten in Höhe des 7. Dorsalwirbelfort-
satzes Schallverkürzung. In diesem Bereich bronchiales Atem-
geräusch. Patient erhält Brustwickel und Transpulmin.
28. XI. 32: Unter Schlechterwerden von Puls und Atmung erfolgt
um 3 Uhr der Tod.
Cardiazol 3 mal 20 Tr.
Amidoptenazol 3 sttl. 0,1.
Mixtura solvens 3 mal 1 Eßlöffel.
2 ccm Transpulmin.

Epikrise. U. M.

In dem Verlaufe der vorstehend mitgeteilten Krankheitsbeobachtung ist das Bild einer besonders foudroyant verlaufenden Gonococcensepsis gegeben. Nach der Endocarderkrankung, die sich, wie es in der Mehrzahl der bekannten Gc-Sepsisfälle beobachtet wurde, auf die Aortenklappen beschränkt, kommt es zu septischen Embolien in allen möglichen Organen, von denen die der A. femoralis wegen der Seltenheit dieses Vorkommens am beachtenswertesten ist, umfomehr, als sie gefolgt ist von einer Fußgangraen. Die sekundäre gemischte Thrombose in der A. femoralis war laut Sektionsbericht nur geringen Grades. Diese Komplikation der Gonokokkensepsis kann als eine sehr seltene angesprochen werden und es konnte bei Durchsicht der Literatur ein zweiter gleich gelagerter Fall nicht ermittelt werden. Julius Heller teilt eine Phlebitis gonorrhoeica der V-saphena und des Plexus pampiniformis mit nachfolgendem Oedem mit. Bei mikroskopischer Untersuchung eines organisierten Thrombus in der Dorsalvene des Penis waren Gonokokken nicht nachzuweisen. Voß vertritt die Auffassung, daß die Thrombosierung der Gefäße nicht eine Folge der Metastasierung einer Sepsis in den Gefäßen darstelle, sondern daß sie vielmehr zurückzuführen sei auf eine auf dem Lymphwege erfolgte Entzündung der Gefäßwand. Die gleiche pathogenetische Auffassung kann bei dem Krankheitsgeschehen in der A. femoralis unseres Kranken nicht angenommen werden. Hier dürfte es sich um eine Embolie, herrührend von der gonorrhoeischen Endocarditis, handeln.

Die Hyperplasie der Magenschleimhaut, sowie die allerdings gereinigten Erosionen in derselben sind als Zeichen einer chronischen Gastritis infolge chronischen Alkoholgenußes zu werten. Zum Gesamtbild des septischen Geschehens passen die bei der Sektion gefundenen Milzveränderungen sowie die degenerativen Prozesse in den Nieren und der Leber.

Herzbeschwerden führen den Kranken zum Arzt. Diese Tatsache muß die Frage aufwerfen, ob am Herzen ein locus minoris resistentiae vorhanden war, der bei der später erfolgten Ausbildung der Gonokokkensepsis förderlich war für die Metastasierung der Gonokokkensepsis am Herzen. Die positive Einstellung zu dieser Frage erscheint berechtigt zu sein. Symptomatologisch ist von Interesse, daß auch in diesem Falle von Gonokokkensepsis und zwar mit fortschreitender Schwere des Krankheitszustandes immer ausgeprägter eine sekundäre Anaemie festzustellen war.

Zusammenfassung.

M. U.

Bei diesem Kranken war die Gc-Sepsis von 7—8-wöchentlicher Dauer.

Die bei dem Kranken sich während der Zeitdauer von 7 bis 8 Wochen darbietende Gonokokkensepsis war vor allem gekennzeichnet durch die Fernkomplikationen in den Gelenken und am Endocard. Zunächst wurde das Metacarpophalangealgelenk IV und etwa 3 Wochen später die großen Gelenke der Hände und Füße betroffen.

Von der 5. Krankheitswoche an entwickelten sich Krankheitszeichen, die auf eine Lokalisation der Gonokokken-Sepsis am Endocard hindeuteten. Gleichzeitig verschlimmerte sich damit der Allgemeinzustand. Die Temperaturkurve nahm einen remittierenden Charakter an. Das Blutbild zeigte eine hochgradige Anaemie. Im Verlauf des septischen Allgemeinzustandes wurde eine mäßige Senkung des Blutdruckes von 140/80 auf 120/60 festgestellt.

Klinisch hatte man den Eindruck, daß auch die Leber mit-ergriffen war, was zum Ausdruck kam in einer Vergrößerung derselben, in einem angedeuteten Subikterus und in einer geringen Steigerung des Bilirubinspiegels 0,45 mgr. % im Blute. Dabei muß offenbleiben, ob die LeberSchädigung auf die Gc-Sepsis zurückzuführen ist oder ob sie ihre Ursache hat in dem chronischen Alkoholismus des Kranken bzw. ob die durch Alkohol geschädigte Leber einen Locus minoris resistentiae abgegeben hat für ihr Ergriffenwerden während der Gc-Sepsis.

Im Sinne einer Sepsis war neben der schon erwähnten, allmählich immer ausgeprägter werdenden Anaemie die beständig ansteigende Leucocytose sowie die Linksverschiebung der Blutformel zu deuten.

In gleichem Sinne deutbar war die Blutsenkungsreaktion.

Eine gefährliche Wendung nahm die Krankheit durch das Auftreten der Thrombosen, die beobachtet wurden im Bereich der linken unteren Extremität; diese führten während der noch sieben-tägigen Lebensdauer zur Ausbildung einer beginnenden Fußgangrän.

An den Anhangsorganen des Urogenitalapparates war außer einer mäßig teigigen Schwellung der Prostata und einem Verwachsensein ihrer Grenzen nichts Krankhaftes festgestellt worden. Im Prostata-Sekret waren keine Gonokokken nachweisbar. Die Sektion bestätigte diesen Befund.

Blutkulturen auf Gonokokken wurden wiederholt, jedoch ohne positives Ergebnis angelegt. Hingegen war die serologische Reaktion auf Gc stark positiv.

Therapeutisch wurde neben der symptomatischen Behandlung der Arthritis und Teudovaginitis mit Stauung, Lichtbädern, Ichthyolfalbenverbänden vor allem eine Gonokokken - Vaccinebehandlung vorgenommen. Zur Anwendung kam das Mailänder Gonokokkenferum, welches 10 Tage hindurch in der Höhe von 10 ccm verabfolgt wurde.

Irgend eine Beeinflussung des Krankheitsablaufes durch dieses Serum konnte nicht beobachtet werden, im Gegenteil, der Krankheitszustand verschlechterte sich fortschreitend.

Herz und Kreislauforgane wurden mit Cardiazol behandelt.

Die Sektion bestätigt im allgemeinen den klinischen Befund. Darüber hinaus wurden anämische Infarkte in Niere und Milz festgestellt, die als eine Folge der ulcerösen Endocarditis anzusehen sind.

Als seltene Folge einer Gonokokkensepsis ist die Embolie mit anschließender Thrombose in die linke Arteria femoralis zu betrachten, die den Beginn einer Gangraenesierung des Fußes bewirkte.

Sektionsbefund.

Gestorben: 30. 11. 32, 3 Uhr

Sektion: 30. 11. 32, 8.15 Uhr

Name: M. U.

Alter: 37 Jahre

Stand: Heizer

Heimat: Berlin

Klinische Diagnose: Gonokokken-Sepsis.

Diagnose:

Gonokokken - Sepsis: globulös - ulceröse Endocarditis zweier Aortenklappen, multiple anämische Infarkte der rechten Niere, Embolie der linken A.femoralis (nach klin. Angabe am 23. 11.) mit beginnender Gangrän des Fußes und geringer sekundärer Thrombose, schwere subakute Milzschwellung mit Follikelhyperplasie; schwere ausgedehnte, teils katarrhalische, teils fibrinöse Pneumonie mit septischem Lungenödem, trockene Pleuritis über dem linken

Oberlappen; starke trübe Schwellung und Oedem der Leber, trübe Schwellung der Nieren. Entfettung der Nebennieren. Hyperplasie der Magenschleimhaut (chronische Gastritis?) mit gereinigten Erosionen der Magenstraße. Geringe Lipoidfleckung der Aorta. Mangelhafte Absetzung des rechten Lungenmittellappens vom Oberlappen und des linken Unterlappens vom Oberlappen.

Zur Therapie.

Die Therapie war in den beschriebenen Fällen insofern verschieden, als sie in dem ersteren in einer rein symptomatischen und chemotherapeutischen Behandlung (mit Heißluft, Bierischer Stauung, Kollargol und Trypaflavin) bestand, in den anderen Fällen dagegen als Serum- und Vaccinetherapie durchgeführt wurde. Die viel gebrauchte und oft empfohlene Behandlung der Gelenke mit thermischen Mitteln ist eine altbekannte und bedarf keiner weiteren Erörterung, ebenso sind das Collargol und Trypaflavin in ihrer Wirkung genau bekannt.

Interessanter zu betrachten und zu kritisieren sind dagegen die beiden anderen obengenannten Behandlungsmöglichkeiten. Zunächst wäre zu erörtern, ob bei der Serumtherapie das Gonokokkenferum, in unserem Falle das Mailänder Gonokokkenferum, spezifisch wirksam ist, oder ob durch die Einbringung eines fremden Serums in den Körper überhaupt im Sinne der Umstimmungs- und Reizkörpertherapie die Heilwirkung erzielt wird. Es ist diese Wirkung umsomehr anzunehmen, als von E. Brunsgaard et Thyotta sowie von Citron, Masson et Borbe (*Annales de Gyn.* 1909) Meningokokkenferum zur Gonokokkensepsisbehandlung in Anwendung gebracht wurde. Brunsgaard glaubt selbst nicht, daß dem Meningokokkenferum eine ausschlaggebende Bedeutung bei der Heilung zukommt, sondern nimmt an, daß die zur Immunisierung aktivierten und ausschlaggebenden Kräfte des Organismus den dominierenden Faktor für die Heilung bilden.

Daß eine Heilung mit diesem Serum erzielt werden kann, daß zum mindesten der Heilungsprozeß wesentlich unterstützt werden kann, zeigt der Erfolg im Falle M. Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß das Fieber schon nach den ersten Injektionen zu sinken begann, daß die Schüttelfröste aufhörten und die anderen Krankheitszeichen weitgehend zurückgingen. Ebenso ist bereits erörtert,

daß es notwendig ist, das Serum in einer Reihe von Injektionen zu verabfolgen, da seine Wirkung erst dann eine wirklich konstante bleibt und Rückfälle in den fieberhaften Zustand vermieden werden.

Das Serum wurde in den beiden Fällen intravenös gegeben und es dürfte diese Art der Injektion als die richtigste und wirksamste anzusprechen sein. Ravaut weist auf die direkte Unwirksamkeit bei subcutaner und intramuskulärer Injektion hin.

Die Vaccine-Therapie konnte ebenfalls einen therapeutischen Erfolg nicht bringen. Verwendet wurde Gonargin, drei Tage hintereinander und es wurden 25 Millionen Keime intravenös injiziert. Da die Temperatur und wie angenommen infolge der Gonarginverabreichung anstieg, wurde diese abgesetzt und infolge der Verschlechterung des Allgemeinbefindens und der beginnenden Kreislauf-Insuffizienz, die bald zum Tode führte, auch nicht mehr angewandt.

Zusammenfassend wäre zu sagen, daß ein abschließendes Werturteil über diese oder jene Art der Therapie nicht ohne weiteres gegeben werden kann, umsomehr, da die rein symptomatische und auch chemotherapeutische Methode in allen Fällen neben spezifischer Therapie mehr oder weniger zur Anwendung kam.

Von einem ähnlichen Ausgang berichtet Janet. Er glaubt, daß die Wirkung der Vaccinekörper erst langsam eintritt, daß diese demnach nur dann einen Erfolg haben, wenn sie sehr bald im Beginn der Erkrankung angewendet werden.

Cholow berichtet über einen sehr schweren Fall von Gonokokkensepsis, bei dem alle 3 Formen der Therapie sich als unwirksam erwiesen haben. Ebenso kam eine Gonokokkensepsis und Endocarditis von Janet trotz der 3 kombinierten therapeutischen Möglichkeiten nach 3 Wochen zum Exitus.

Diese von Janet vertretene Meinung ist durchaus wahrscheinlich, da es sich ja allgemein bei der Vaccinetherapie um eine Reiztherapie höheren Grades handelt, durch welche die kranken Zellen in einen allergischen Reaktionsgrad versetzt werden. Dabei ist es notwendig, daß die Zellen oder ein Zellenkomplex noch relativ gesund und nicht weitgehend geschädigt sind. Die in zweiter Linie erbrachte Bildung von Immunistoffen ist ebenfalls nur durch gesunde Zellen möglich und ist außerdem von einer gewissen Zeitdauer abhängig.

Obwohl in allen 4 Fällen Blutkulturen angelegt wurden, gelang es in keinem, die Gonokokken auf einem der Gonokokken völlig

entsprechenden Nährboden zu züchten. Hingegen waren die spezifischen Blutreaktionen vier- und noch mehrfach positiv.

Die Frage, weshalb die Gonokokken in vielen Fällen nicht aus dem Blute gezüchtet werden können, ist des öfteren erörtert worden (besonders Finger und Schlangenhauer haben sich damit beschäftigt) und vor allem folgenden Punkt dafür verantwortlich gemacht: Sie nehmen an, daß infolge der Einwirkung der Fiebertemperaturen die Gonokokken ihre Lebensfähigkeit weitgehend einbüßen.

Nach Prokaska hängt der Erfolg der kulturellen Züchtung von der Menge des entnommenen Blutes ab und er empfiehlt eine große Menge desselben zu verwenden. (Vielleicht wurde in den Fällen zu wenig oft die Untersuchung angestellt.)

Zusammenfassung.

Im Vorstehenden wurden 4 Fälle von Gonokokkensepsis mitgeteilt, von denen 3 tödlich verliefen.

Mit dieser Kasuistik sind sämtliche tödlich verlaufenden Gonokokken-Sepsis-Fälle erfaßt, die in den Nachkriegsjahren in der Berliner Universitäts-hautklinik beobachtet wurden (neben dem schon oben erwähnten Fall, der als geheilt entlassen werden konnte). Bei der Reichhaltigkeit des Krankenmaterials dieser Klinik dürfte diese geringe Zahl eine Bestätigung der in der Einleitung mitgeteilten, 1894 erfolgten Feststellung von His sein, daß die tödliche Gonokokkensepsis äußerst selten ist.

Auch die Erfahrungen des derzeitigen Direktors der Klinik (Professor Frieboes) sind die gleichen, konnte er doch während seiner 20jährigen Tätigkeit in Rostock nur zwei Fälle von tödlich verlaufener Gonokokkensepsis beobachten. Auch die verhältnismäßig wenigen Mitteilungen der Literatur zu diesem Thema bestätigen die Seltenheit der tödlichen Gonokokkensepsis.

Diese Feststellung gewinnt umsomehr an Bedeutung, wenn man berücksichtigt, daß die Gonorrhoe heute zum mindesten in Deutschland die häufigste Infektionskrankheit ist, wie das erst jüngst J. Breger *) an Hand großer statistischer Belege dargetan hat.

*) Breger: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten Band 30/I.

Suchen wir uns an Hand der eigenen Beobachtungen und an Hand der Literatur ein Bild über die Symptomatologie der Gonokokkensepsis zu machen, so ergibt sich uns das Folgende:

Die Gonokokkensepsis grenzt sich nicht scharf und bestimmt gegenüber Sepsiserkrankungen anderer Aetiologie ab, wenn man abfieht von dem Erscheinungsbild des Urogenitalapparates. Berücksichtigt man aber, daß der Arzt gelegentlich einem Gonokokkensepsiskranken gegenübertritt zu einer Zeit, wo die Gc-Erscheinungen des Urogenitalapparates bereits abgeklungen sind bzw. nicht mehr im Vordergrund stehen, so ergibt sich die Schwierigkeit der Erfassung der aetiologischen Bedingtheit einer zu begutachtenden Gonokokkensepsis.

Immerhin sind bei der Gonokokkensepsis Symptome vorhanden, die bei Begutachtung einer Sepsis den Blick auf die Möglichkeit des Vorliegens einer Gonokokkensepsis lenken können. Diese sind das vornehmliche Betroffensein des Bewegungsapparates in Verbindung mit einer Endocarderkrankung. Beachtet man alsdann, daß bei der Gc. das Erkranken der Gelenke gegenüber dem Betroffensein der übrigen Teile des Bewegungsapparates weit im Vordergrund steht, und daß bei der Gc. die Erkrankung der großen Gelenke im Vergleich zu den kleinen zahlenmäßig ganz hervorstehend auftritt, daß fernerhin bei Gc. die Gelenkerkrankung sich oft als monarticuläre einleitet, so sind dies schon Züge, in denen sich die Gonokokkensepsis von anderen Sepsiserkrankungen und insbesondere von der polyarthritischen bis zu einem gewissen Grade unterscheidet.

Symptomatologisch ist die Gc-Gelenkerkrankung an sich dann wieder gekennzeichnet dadurch, daß sie meist nach einem kurzdauernden (1—2 Tage) mehr oder minder unbestimmten polyarthritischen Beschwerdenkomplex sich bemerkbar macht durch äußerst heftige Schmerzanfälle in den alsdann fast vollkommen bewegungsbehinderten und akute Entzündungsercheinungen aufweisenden Gelenken. Demnach ist es die Verlaufsweise, insbesondere die mit der ersten Metastasierung in den Gelenken, wodurch sich die Gonokokkensepsis abhebt von anderen Sepsisfällen. Aber nicht immer sind zuerst die Gelenke und nachfolgend das Herz bei septischer Gc-Erkrankung ergriffen, wobei die Herzerkrankung sich meist als Endocarditis darbietet. Die Endocarditis gonorrhoeica ist aber meist nicht die einzige Beteiligung des Herzens, auch Pericarditis und feltener Myocarditis kommen zur Beobachtung. (Joch-

mann, Hegler.) Dies erleben wir z. B. aus dem Falle Brunsgaard, bei dem die Gonokokkensepsis eingeleitet wurde durch eine Purpura und Meningitis, welch letztere durch Brunsgaard als durch die Gc. bedingt nachgewiesen wurde. Ist die Haut bei der Gc-Sepsis beteiligt, so sind die dabei auftretenden Hauterscheinungen vielfach weitgehend charakteristisch für eine Gonokokkensepsis. Uncharakteristisch sind natürlich Purpuraexantheme, die bei jeder Sepsis beobachtet werden. Hingegen sind die psoriasiformen, vor allen plantar und palmar auftretenden Exantheme als weitgehend charakteristisch für Gc. zu betrachten, man muß aber doch beachten, daß diese psoriasiformen Exantheme auch bei anderen nicht gonorrhöischen Erkrankungen festzustellen sind.

Auch die Art des Fieberverlaufes mit seinem stark intermittierenden Typ kann als charakteristisch für Gonokokkensepsis angesehen und differentialdiagnostisch gegenüber anderen Sepsisformen herangezogen werden.

Entscheidend für die Diagnose wird natürlich stets die Blutkultur sein. Man darf aber nicht außer Betracht lassen, daß zu einer gonorrhöischen Erkrankung der Genitalorgane, insbesondere der Prostata und Samenblase, eine Mischinfektion hinzutreten kann, die dann ihrerseits die Sepsis hervorruft.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Gottron für die Anregung zur Dissertation, die Ueberlassung des Materials und die gewährte Hilfe meinen besten Dank zu sagen.

Literatur-Verzeichnis

1. His, W. Ueber Herzkrankheiten bei Gonorrhoe. Berl. Med. Wochenschrift 1892, Nr. 40.
2. Faure et Beaulieu. La septicaemie gonococcique au point du vue clinique et thérapeutique. Journal Médical français, Mars 1926.
3. Finger, zit. nach Dittrich aus Jadassohn Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Bd. XX Seite 2, Verlag J. Springer.
4. Cholzow, zit. wie vorstehend.
5. Ravaut et Boulin. Der blennorrh. Rheumatismus. Paris, Gaston Doin 1930.
6. Chosteck. Zeitschr. f. Klin. Med. 124, Seite 414.
7. Risak u. Winkler. Deutsches Arch. f. Klin. Med. Bd. 165, 1929.
8. Keller, Rudolf. Ueber einen Fall von maligner Endocarditis an den Klappen der A. pulmonalis nach Gonorrhoe. Aus der Med. Klinik Freiburg. D. Arch. f. Klin. Med. Bd. 27, 1896.
9. Durand, P., zit. n. Handbuch f. Inn. Med. von Bergmann-Stahelin II/I. Seite 376.
10. Dubot, R. Ann. de Policlinique centr. Bruxelles. 1902, Seite 245.
11. Finger, Wiener Med. Presse 1880, S. 48—50.
12. Mathieu, A. Thèse de Paris 1883.
13. Philipps, W. A. Journ. americ. med. Ass. 1889. Chicago.
14. Meyer, Dermat. Ztr. Bl. Bd. 948.
15. Weiß, Franz. Arch. f. Dermat. Bd. 57, S. 189.
16. Cholzow, Ztschr. f. Urol. 1911, S. 961.
17. Brunsgaard et Thjøtta. Contribution à l'étude de l'infection générale gonococcique et purpura gonococcique. Ann. de Derm. 1925, S. 114.
18. König. Polyarthrikuläre Fernkomplikationen bei Gonorrhoe. Zit. n. Jadassohn. Handb. f. Haut- u. Geschl.-Krk. Bd. 20/2.
19. Gantenberg u. Sandmann. Zur Klinik der gonorrhoeischen Gelenkerkrankungen. D. Arch. f. Klin. Med. Bd. 178, H. III.
20. Heller, Julius. Ueber Phlebitis gonorrhoeica. Berl. Klin. Wochenschrift XLI/23, 1904.
21. Citron. Erfolge der Gonococcensepsisbehandlung mit Meningococcenserum. Med. Wochenschr. 1921.
22. Masson et Barbe. Ann. de Gynaec. 1909.
23. Janet-Afch. S. 275.
24. Cholzow, Ztschr. f. Urologie 1911, S. 961.
25. Finger, Prophylaxe und Behandlung der Gonorrhoe. D. Med. Wochenschrift XXX¹/7. 1905.
26. Prokaschka. Ueber die gonorrhoeische Allgemeininfektion. Virchows Arch. Bd. 164.
27. Jochmann-Hegler. Bln. Julius Springer 1924.
28. Breger. Mitt. d. D. Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Bd. 30/1.

Lebenslauf

Am 25. IV. 1908 wurde ich, H u b e r t G a l m , als Sohn des Forstmeisters Heinrich Galm in Wertheim a. M. geboren. Im März 1927 absolvierte ich am Realgymnasium in Würzburg. Das Physikum bestand ich 1929 in Würzburg. In den klinischen Semestern studierte ich in Berlin und Rostock. Das medizinische Staatsexamen habe ich in Rostock am 24. XI. 1932 bestanden.

Im Medizinalpraktikantenjahr war ich tätig an der Universitäts-Hautklinik zu Berlin, an der medizinischen Universitätsklinik in München und am Pathologischen Institut des Rudolf Virchow-Krankenhauses zu Berlin. Am 1. Dezember 1933 bekam ich die Approbation.